

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁ ଚାଷ

ସମ୍ପାଦନା

ଡଃ. ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି,

ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡେଙ୍କାନାଳ

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

ଡଃ ରୋଜାଲିନ ମହାନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ (କୃଷି ସଂପ୍ରସାରଣ)

ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ସାହୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ)

ଡଃ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କର, ବୈଜ୍ଞାନିକ (ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ)

ଡା. ରୋଶ୍ମି ବାଳା ନାୟକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ (ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ)

ଡଃ ସେଫାଳି ରାଉତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ (ବନ ବିଭାଗ)

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ (କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ)

ଶ୍ରୀମତୀ ସର୍ବସ୍ୱାରିକା ବେହେରା (କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳିକା)

ଶ୍ରୀ ଅମ୍ଳାନଜ୍ୟୋତି ଖୁଣ୍ଟିଆ (Asst. Manager Livelihood,

CBSAE Development Project)

ସୁଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ସାହୁ (SRF, NICRA-TDC Project)

ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ : ୨୦୨୪

ପ୍ରକାଶକ



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡେଙ୍କାନାଳ
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ



ଉପକ୍ରମ

ଭାରତ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଦେଶ । ଏଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଦେଶର ୬୫ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି । ଭାରତ ୨୦୦ ମିଲିୟନ ଚନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶାସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛି । ତଥାପି ଅପପୁଷ୍ଟି, ବାରିଦ୍ରୁ୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମାଂଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି । ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥା ଧନ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି । ଏହି ଧନ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଛତୁଚାଷ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ । ଛତୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚା'ର ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏକ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଅଛି ।

ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛତୁଚାଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଅଛି । ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକା ପଡିଥାଏ । ଏଣୁ ଧୂଳୀରି ଛତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଖରାଦିନେ ଏବଂ ବର୍ଷାଦିନେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କଲେ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଧାନଚାଷରେ ଆଗୁଆ ଅଛି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ନଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ । ଏଣୁ ଆମ ଚାଷିଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଗୌଶକୃଷି ହିସାବରେ ଛତୁଚାଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ପୁଷ୍ଟିହାନତା ଦୂର କରିପାରିବେ । ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାରୋଟି ଜାତିର ଛତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ବୋତାମ ଛତୁ, ଶାମୁକା ଛତୁ, ପାଳଛତୁ ଏବଂ ଦୁଧଛତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଳଛତୁ ଏବଂ ଧୂଳିର ଛତୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ।

ପାଳଛତୁ

ପାଳଛତୁ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଛତୁ । ୧୮୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଛତୁ ଚୀନ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଚୀନାଛତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଭାରତବର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବାଧିକ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ପାଳଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ୮୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ଯାହା ସମୁଦାୟ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ । ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ ।

ପାଳଛତୁ ଚାଷର ବିଶେଷ ଗୁଣ :

- ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ବାଦ ତଥା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ।
- ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିଯୁକ୍ତ ଫସଲ (୧୨-୧୫ଦିନ) ।
- ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ।
- ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳେ ।
- ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଚାଷ ସମ୍ଭବ ।



- ▶ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଓ ଉପଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ।
- ▶ ରୋଗ ଓ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ।
- ▶ ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ବା ଜୈବବିବିଧତା ସର୍ବନିମ୍ନ (୧୫ ପ୍ରତିଶତ) ।
- ▶ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟତମ (୧୨ ଘଣ୍ଟା) ।
- ▶ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନ୍ୟ ଛତୁ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନଡ଼ା ଦରକାର (୧୦-୧୧ କେ.ଜି./ବେଡ଼) ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳବାୟୁ :

ତାପମାତ୍ରା : ଏହି ଛତୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ୨୫ରୁ ୩୮° ସେଲ୍‌ସିଅସ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ୩୨-୩୪° ସେଲ୍‌ସିଅସ୍ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ଅଧିକ ମିଳେ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ସମୟ ସମୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୪୦° ସେଲ୍‌ସିଅସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆର୍ଦ୍ରତା : ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆଲୋକ : ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ପାଳଛତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋକ (୧୦୦୦ ଲକ୍ଷ) ଆବଶ୍ୟକ କରେ । କିନ୍ତୁ ବେଡ଼ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ବାୟୁଚଳାଚଳ : ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଉଚିତ୍ । ପାଳଛତୁ ଗଠନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ :

ନଡ଼ା : ଧାନ ନଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଗହମ ନଡ଼ା, ମାଣ୍ଡିଆ ନଡ଼ା, ଆଖୁଛେଦା, କଦଳୀପତ୍ର, ବିଲାତି ଦଳ ଓ ଲୁଗା କଳର ମଇଳାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ବେଙ୍ଗଳା ଝଡିଥିବା ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମନା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ଭବ । ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଷ୍କଥିବା ଚାଣ ନଡ଼ା ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ମାଧ୍ୟମର ଗୁଣାତୁଳ ମାନ ଛତୁର ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତିକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

ଛତୁ ବିହନ : ପାଳଛତୁର ତିନୋଟି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କିସମ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କିସମ ଯଥା- ଭଲଭାରିଲା ଭଲଭାସିଆ (କଷରା ରଙ୍ଗ) ଓ ଭଲଭାରିଲା ତିପ୍ପାସିଆ (ଧଳାରଙ୍ଗ) ଚାଷ କରାଯାଉଅଛି । ଭଲଭାସିଆ କିସମ ମାଂସଳ ଓ ଆକାରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ । ତେବେ ତିପ୍ପାସିଆ କିସମ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଓ କମ୍ ମାଂସଳ । ଉଭୟ କିସମର ସ୍ୱାଦ, ଗନ୍ଧ ତଥା ଉତ୍ପାଦକତା ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ । ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ବିହନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଉଭୟ କାତବୋତଳ ଏବଂ ପଲିପ୍ୟାକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିହନ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ।

ଜୈବିକ ପରିପୂରକ :

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବକଜାଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିହନ ସହିତ ପଟାଳିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବୁଟ, ହରଡ଼, କୋଳଥ, ମସୁର, ମୁଗ, ବିରି ବା ବରଗୁଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ବିକଳ ଭାବରେ ଧାନ କୁଣ୍ଡା ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ।

ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

ନଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ : ଉଭୟ ମୂଳ ଏବଂ କେଣ୍ଡା ପଟକୁ ବାବଦେଇ ନଡ଼ାକୁ ୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବରେ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ । ୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୨ ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ୧ ଫୁଟ ୯ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଦରକାର ପଡ଼େ । ତେବେ, ଛତୁ ପଟାଳିର ଆକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ପଟାଳିର ଆକାର ୧.୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧.୫ ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ୧.୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ୬ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ । ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲମ୍ବରେ କାଟିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ୬ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରାଇବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ, ନଡ଼ା ବା ପାଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଫିମ୍ପି ବା ବାଜାଣୁ ଥିବା ହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛତୁ ଫିମ୍ପି ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥାନ୍ତି । ଫଳତଃ ଛତୁର ଉତ୍ପାଦିକତା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ । କୋପ୍ରାଜନସ୍ ପ୍ରକାଶିତ ଛତୁ ପାଳଛତୁର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଅଟେ । କୋପ୍ରାଜନସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ବଜୁଥିବା ସମୟରେ ପାଳଛତୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ଫିମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ା ବା ପାଳ ବତୁରାଯାଇଥିବା ପାଣିରେ ୧ ରୁ ୨ ପ୍ରତିଶତ ଚୂନ ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ ।



ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଖାଲି ପାଣିରେ ବତୁରାଇ : ଯାଇଥିବା ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ଗରମ ପାଣି ଅଥବା ବାଷ୍ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଫିମ୍ପି ବା ବାଜାଣୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ, ଛତୁଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା କଷ୍ଟସାପେକ୍ଷ ।

ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ନଡ଼ା ବା ପାଳ ବତୁରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଓ ୧୨୫ ମିଲି ଲିଟର ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ନଡ଼ା ବା ପାଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରାଯାଇପାରେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପାଳଛତୁ ଫିମ୍ପିର ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଫିମ୍ପିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ କେବଳ ଚୂନ ପାଣିରେ ନଡ଼ା ଉପଚାର କଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ । ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାସାୟନିକ ଉପଚାର ଅପେକ୍ଷା ଅଣ-ରାସାୟନିକ ଉପଚାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରା ନଡ଼ାରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏଥିପାଇଁ ନଡ଼ାର ମୂଳପଟ ଉପରକୁ କରି ଛାଇରେ ତଥା ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ । ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନଡ଼ାରେ ୬୫ ଭାଗ ଜଳାୟ ଅଂଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ନଡ଼ାକୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପାଣି ବାହାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହାତରେ ଧରିଲେ ପାପୁଲି ସଦା ରହେ ।

ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ନଡ଼ାର ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୨ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ ୨ ଫୁଟ ଓସାରର ବାଉଁଶ ବା କାଠର ଭାଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଭାଡ଼ିର ଉଚ୍ଚତା ମାଟି ପତନ ଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପଟାଳିକୁ ମୃତ୍ତିକା ଜାତ ଅଣୁଜୀବ ତଥାଭଲ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ପଟାଳିର ତଳ ଅଂଶ ବାୟୁ ଓ ଆଲୋକକୁ ଉନ୍ନତ ରହିବ ।

ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପଟାଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ବା କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ୨ରୁ ୩ଟି ଥାକ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ, ଗୋଟିଏ ଥାକରେ ଦୁଇଟିପଟାଳି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏକ ଫୁଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଥାକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ବିହନ ସଂଗ୍ରହ :

ସାଧାରଣତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ବିହନ ୩୭୫ ମିଲି କାଚ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଚ ବୋତଲର ବିହନ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ । ଛତୁ ପଟାଳି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଶୁଖିଲା ମାଧ୍ୟମ ବା ନଡ଼ାର ୩ ପ୍ରତିଶତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅର୍ଥାତ୍ ୧.୫ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧.୫ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ୧.୫ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ (ଏକ ବୋତଲ) ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ପଟାଳିର ଆକାର ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହେଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବିହନର ପରିମାଣ କମ୍ ବା ଅଧିକ କରାଯାଇ ପାରେ । ତିନି ସପ୍ତାହରୁ ଏକ ମାସର ଧଳା ବା ଇସବ୍ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ବିହନ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।

ଜୈବିକ ପରିପୂରକ :

ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ବା ମାଧ୍ୟମର ୨% ହିସାବରେ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ପଟାଳିର ଆକାରକୁ ନେଇ ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ତାଲିଗୁଣ୍ଡ ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କୌଣସି ଫିଫି ବା ପୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର ।

ପଲିଥିନ୍ ଚଦର :

ଛତୁ ପଟାଳିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ୬ଫୁଟ ଓସାରର ଧଳା ଜରି ଚଦର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପାରେ । ଛତୁ ତଳେ ଜାଲର ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜରି ଚଦର ଦ୍ୱାରା ପଟାଳିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଭଲ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପଟାଳିରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳାୟାଣ ଓ ଉତ୍ତାପ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରେ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛତୁ ପଟାଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ।

ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ବୋତଲରେ ଥିବା ଛତୁ ବିହନ, ବୋତଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର କରାଯାଏ । ବିହନ ପିଣ୍ଡଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ (୨-୩ସେ.ମି.) ପରିଣତ କରି ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ସେହିପରି ତାଲିଗୁଣ୍ଡ ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼କୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ଏଥିସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳାୟ ଅଂଶ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ନଡ଼ା ତଥା ଜରି ଚଦରକୁ ଭାଡ଼ି ନିକଟରେ ରଖିବା ଦରକାର ।

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ-ପର୍ଯ୍ୟାପ ବା ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରି ନଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯେପରି ନଡ଼ାର ମୂଳଅଂଶ ଉଭୟ ପଟକୁ ରହିବ । ନଡ଼ା ସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା ୧୨.୫ରୁ ୧୫ସେମି (୫ରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ) ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଡ଼ା ଉପରେ ଧାରରୁ ୩ ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଛତୁ ବିହନକୁ (୫୦-୬୫ଗ୍ରାମ୍) ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ତାଲି ଗୁଣ୍ଡ ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼କୁ (ପ୍ରାୟ ୫୦ଗ୍ରାମ୍) ମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଣି ଦିଆଯାଏ ।





ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଉପରେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଡ଼ାର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ସହିତ ସମାନ ହେବ । ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ପରି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିହନ ତଥା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଡାଲିଗୁଣ୍ଡ ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଉପରେ ଏହାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର ତୃତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହା ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧା ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧା ଡାଲିଗୁଣ୍ଡ ବା ଗହମ ଚୋକଡ଼କୁ ଚାରି କଡ଼ରେ ଏବଂ ମଝିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ତେବେ ବିହନ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଉପରେ ୫ରୁ ୭.୫;ସା/ମି (୨ରୁ ୩ ଇଞ୍ଚ) ବହଳର ନନା ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରର ନଡ଼ା ଦେବାପରେ ପଟାଳିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଚାପି ପଲିଥିନ୍ ଚଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :

ପଟାଳି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଛତୁ ଫିମ୍ପିର ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଲୋକ ତଥା ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ପଟାଳିରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼େନାହିଁ । ତେବେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନଡ଼ାର ବତର କମ୍ ଥିଲେ ଜରି ଚଦର ବାହାର କରି ହାଲୁକା ଭାବେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ପାରେ । ପ୍ରାୟ ୭-୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିମ୍ପିର ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ଶେଷହୁଏ । ଫିମ୍ପି ନଡ଼ାର ପଟାଳି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଡିଗଲେ ଜରି ଚଦରକୁ ବାହାର କରାଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପାଗକୁ ଦେଖି ଦିନକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ଓ ଆମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ।

ଛତୁ ଅମଳ :

ପଟାଳି ପଡିବାର ୯-୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଗୁଦାନା ଭଳି ଧଳା କଢ଼ ପତ୍ତୀର ଚାରିପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତ୍ରୋ ଆସେ ବଡ଼େ ଓ କଳା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ପାଗ ଅନୁଗୁଳ ଥିଲେ ୧୪-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଛତୁ ଅମଳ କରାଯାଏ । ତେବେ ସମୁଦାୟ ଅମଳର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଛତୁ ପ୍ରଥମ ଅମଳରେ ମିଳେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅମଳ ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ତାପରେ ପଟାଳିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ୭-୮ ଦିନ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଛତୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ପାଳଛତୁ ଫସଲର ଅବଧି ୧୫ଦିନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସମୁଦାୟ ଫସଲ ଚକ୍ର ୨୧-୨୨ ଦିନ । ପାଳଛତୁର ଉତ୍ପାଦିକତା ଶକ୍ତି ବା ଜୈବ ଦକ୍ଷତା ୧୦ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ । ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ୧୦କିଲୋ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ାରୁ ୧ରୁ ୧.୫ କିଲୋ ଛତୁ ଅମଳ କରାଯାଇ ପାରେ ଛତୁ ଆମଳର ୧୨ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ । ଛିଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ୧୦୦ ଗଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଜରି ଖୋଳରେ ୨୫୦ ବା ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଛତୁ କଢ଼ ପୁରାଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ ।

ଆୟ ବ୍ୟୟ :

(୧.୫' x ୧.୫' x ୧.୫' ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ପାଇଁ)

ପଟାଳି ପ୍ରତି ଛତୁ ଆଦାୟ : ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ (ହାରାହାରି)

ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ : ଟ. ୮୦.୦୦ (ସର୍ବନିମ୍ନ)

ନେଟ୍ ଲାଭ (ପଟାଳି ପ୍ରତି) : ଟ. ୪୦.୦୦ (ପ୍ରତି ୧୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ସ୍ଥାନରୁ)

କ୍ର.ନଂ. ସାମଗ୍ରୀ	ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କା)
୧. ନଡ଼ା	୭.୦ କି.ଗ୍ରା.	୧୪.୦୦
୨. ବିହନ	୨୦୦ଗ୍ରାମ୍	୧୨.୦୦
୩. ଗହମ ଚୋକଡ଼	୧୫୦ଗ୍ରାମ୍	୩.୦୦
୪. ଚକ୍‌ପାଉଡର	--	୫.୦୦
୫. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ	--	୬.୦୦
ମୋଟ୍ ବ୍ୟୟ		୪୦.୦୦

କେତେକ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ :

- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ତଥା ନଡ଼ା ବା ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ନଡ଼ା ବା ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ନଡ଼ା ବା ମାଧ୍ୟମର ବତର ଠିକ୍ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପଟାଳିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଲୋକ, ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- ମନେରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ପଟାଳିରେ ଯେପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ସଂଗ୍ରମଣ ରହେ । ନଚେତ୍, ଅମଳ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।
- ଛତୁ ସବୁବେଳେ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମଳ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଫୁଟା ଛତୁରେ ତନ୍ତୁ ତଥା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ।
- ପାଳଛତୁର ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଲା ବର୍ଷାରତ୍ନ । ତେବେ ଆମେ ଏବେ ପାଳଛତୁକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବା ଶୀତ ରତ୍ନରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଛତୁ ପଟାଳିର ଆକାରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର । ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ପଟାଳି ତଥା ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ବନ ପଟାଳି ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଲେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ଅର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରାୟ ୩ ଗୁଣ ମମିଲେ । ତେବେ, ଏହାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଛତୁ ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ।

ପାଳଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପାଳ ଛତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଥା- ୧- ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ୨- ଘର ଭିତରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ୩- ଉନ୍ନତ ଜାଳି ପ୍ରଣାଳୀ ।

ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ- :

ପାଳ ଛତୁକୁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ / ଖୋଲା ଯାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ସବୁ ଯାଗାରେ ପରିଚିତ । ନଡ଼ାକୁ ଝାଡ଼ି ସମାନ ଆକାରର କାଟି ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ରଖାଯାଏ । ନଡ଼ାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ବତୁରାଇବା ବେଳେ ପ୍ରତି ୧୦ଲିଟର ପାଣିରେ ୮-୧୦ ବାଲିଷିନ, ୧ ମିଲି ଫର୍ମାଲିନ୍ ବା ୨% ତୁନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ । ନଡ଼ା ବତୁରାଇବା ପରେ ପାଣିରୁ ଛାଣି ସିଧାକରି ୧ ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ନଡ଼ାର ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୫% ରହିବ । ଦେଖିବେ ନଡ଼ାକୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବା ମାତ୍ର ହାତକୁ ଓଦା ଲାଗୁଥିବ । ଏହାପରେ ବୋତଲ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଙ୍ଗି, ତାକୁ କାଟି ୪ ଭାଗ କରି କାଗଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ତାଲିଗୁଣ୍ଡ (୨୦୦ ଗ୍ରା/ବେଡ଼) ନେଇ

୪ ସମାନ ଭାଗ କରିବେ । ବାଉଁଶ ଭାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା'ଉପରେ ବେତ ପକାଇବେ । ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ୬ଇଞ୍ଚ ବହଳ ନଡ଼ାକୁ ସଜାଇ ରଖିବେ । ନଡ଼ାର ପାର୍ଶ୍ବରୁ ୧.୫ ଇଞ୍ଚ ଛାତି ୧ ଭାଗ ମଞ୍ଜିକୁ କତେ କତେ ରଖିବେ, ତା'ଉପରେ ଡାଲିଗୁଣ୍ଡକୁ ମଝିରେ ସିଞ୍ଚିଦେବେ । ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତରରେ ୬ ଇଞ୍ଚ ବହଳ ନଡ଼ାକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସଜାଇ ରଖିବେ । ନଡ଼ାର ପାର୍ଶ୍ବରୁ ୧.୫ ଇଞ୍ଚ ଛାତି ୧ ଭାଗ ମଞ୍ଜିକୁ କତେ କତେ ରଖିବେ, ତା'ଉପରେ ଡାଲିଗୁଣ୍ଡକୁ ମଝିରେ ସିଞ୍ଚିଦେବେ । ଏହିପରି ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ନଡ଼ାକୁ ସଜାଡିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଉପରିଭାଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଡାଲିଗୁଣ୍ଡକୁ ସିଞ୍ଚିଦେଇ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ । ତା'ପରେ ବେତଟିକୁ ଧଳା ପଲିଥିନ ଦ୍ବାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ, ଯେପରି ବାହାରର ପବନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଭାବରେ ୫ରୁ ୧୦ ଦିନ ରଖିବା ପରେ ଦେଖିବେ ପଲିଥିନ ଭିତରେ ନଡ଼ା ଚାରିପଡ଼େ ଛତୁର ଫିମି (କବକ ଜାଲ)ମାଡି ଶାଗୁଦାନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ । ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶାଗୁଦାନା ଗୁଡିକ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ । ଏହାପରେ ବେତରୁ ପଲିଥିନକୁ ଖୋଲି ଦେବେ । ବେତର ଆର୍ଦ୍ରତା (୬୫%) ଅନୁଯାୟୀ ଦିନକୁ ୨/୩ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚିବେ । ୧୦-୧୧ ଦିନ ପରେ ବେତରୁ ଛତୁ ଡୋଳିବେ । ସର୍ବଦା ଛତୁକୁ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଡୋଳିବେ । ମଞ୍ଜି ପକାଇବାର ୧୦-୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଛତୁ ଅମଳ କରିପାରିବେ । ସମୁଦାୟ ଗୋଟିଏ ବେତରୁ ୧ରୁ ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. ଛତୁ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ଘର ଭିତରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁଚାଷ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥାଏ ।

କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି : ପ୍ରଥମେ ୫୦% ନଡ଼ା ଓ ୫୦% ବର୍ଜ୍ୟ ତୁଳାକୁ ନେଇ ବତୁରାଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଧାନ ନଡ଼ାକୁ ନେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ନଡ଼ାକୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଓଦାକରି ୪ ଦିନ ରଖିବେ । ତା'ପରେ ନଡ଼ାରେ ୧% ଚୂନ ମିଶାଇବେ । ଯେପରି ନଡ଼ାର କ୍ଷାରତ୍ବ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଠିକ୍ ରୁହେ । ଏହି ନଡ଼ାକୁ ନେଇ ୫ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ ୫ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଗଦା କରିବେ । ୨ଦିନ ପରେ ଏହି ଗଦାକୁ ଖୋଲି ଏଥିରେ ୫% କୁଣ୍ଡା ମିଶାଇ ଦେବେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଆଉଥରେ ଗଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ତାହାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ସେମିତି ରଖିବେ ।



ଛତୁଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଏହି ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଘର ଜଟା, ସିମେଣ୍ଟ ବା ପଲିଥିନ ମୋଟା ଚାଦର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଘରେ ପବନ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଏକ୍ଜକ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବେ । ଚଟାଣ ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଘର ଭିତରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯେପରିକି ଗରମ ବାଷ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୋଠରୀ ବିଶୋଧନ କଲାବେଳେ କୋଠରୀଟି ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଘରର ଚଉଡ଼ା ୧୨/୧୩ଫୁଟ ଏବଂ ଲମ୍ବ ୧୮/୧୯ ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା ୮/୯ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଲୁହା କିମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ୨/୩ଟି ଥାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଯାହା ଉପରେ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଯାହା ଉପରେ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଥାକ ଉପରେ ୫-୧୦ ସେମି ବହଳର ନଡ଼ାକୁ ବିଛାଇ ଦେବେ । ଖରାଦିନେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତାକୁ କମ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଗରମ କମ୍ ରହିବ । ତା'ଉପରେ ୧୫ସେମି ବହଳର କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖିବେ । ୮-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗରମ ବାଷ୍ପ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡିବେ, ଯେପରି କି ଘର ଭିତରଟି ୬୫° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ୬ ଘଣ୍ଟା ରହିବ । ଏହା ଫଳରେ ଥାକ ଉପରେ ଥିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଗୃହଟିକୁ ୨୪ରୁ ୩୬ଘଣ୍ଟା ୫୦° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଏ । ତା'ପରେ ଗୃହଟିକୁ ଖୋଲି ଉତାପକୁ ୩୫° ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ବିଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ଫାର୍ମର ଆକାର ଓ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଅତି କମ୍ରେ ଜଣେ ଚାଷି ୨୦୦ଲି. ତେଲ ତ୍ରୁମ୍ କିଣି ତା'ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା'ତଳେ ଷୋଭ୍ କିମ୍ବା କାଠ ଜାଳି ଗରମ ବାଷ୍ପ ବାହାର କରିବେ । ତ୍ରୁମ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଉପରେ କିମ୍ବା ଶୋଭ୍ ରହିଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣାକରି ୩ ସେମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ସଲଗ୍ନ କରିବେ । ସେହି ପାଇପ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ । ଘର ଭିତରେ ଲମ୍ବିଥିବା ପାଇପ୍ରେ କଣା ଥିବ । ସେହି କଣା ଦେଇ ଗରମ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ ହେବ । ୧୨ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧୮ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଗରମ କରି ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପରେ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରୟୋଗ : ଶୁଖିଲା କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ୧.୪% ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଓଦା କମ୍ପୋଷ୍ଟର ୦.୪% ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ୨ରୁ ୨.୫ ସେମି ଗଜାରତା ଓ ୧୨-୧୫ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ପକାଇ ତା'ଉପରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିଛାଇ ପଲିଥିନ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ୩୨° - ୩୪° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବେ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ : ଛତୁ ଫିମ୍ପି ମାଡିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଓ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ପବନର ଆବଶ୍ୟକ । ୩-୪ ଦିନ ପରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ଓ ପବନ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଏ । ୪-୫ ଦିନ ପରେ ବେତରୁ ପଲିଥିନ୍ କାଢି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚିବେ । ୫-୫ଦିନ ପରେ ଆଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଡୋ ଜାଳି ମାଡି ଶାରୁଦାନା ଭଳି ଛତୁ କଢ଼ ଦେଖାଯିବ । ୧୦ଦିନ ବେଳକୁ ଛତୁ ବେତରୁ ପ୍ରଥମ ଅମଳ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଅମଳରେ ପ୍ରାୟ ୬୫% ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବେତରୁ ୩ କିଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳେ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁଚାଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ । ଏବେ କିଛି ଚାଷୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଉନ୍ନତ ଯତ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ : ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁଚାଷ ଏକ ଯତ୍ନ ଭିତରେ କରାଯାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ : ୧. ନଡ଼ାବିଡ଼ା-୬୦ ଯତ୍ନା, ୨. ମଞ୍ଜି ବୋତଲ-୨ ଯତ୍ନା, ୩. କାଠ/ବାଉଁଶ-୧ଟି ଯତ୍ନା (୧ମି x ୫୦ x ୨୫ସେମି), ୪. ତ୍ରୁମ୍-୧ଟି (୧୦୦ ଲି ପାଣି ଧରିଲା ଭଳି), ୫. ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍-୪ ମିଟର, ୬. ବାନ୍ଧିବା ସୁତା/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରସି-୩ ମିଟର, ୭. ସେୟର/ରୋଜକେନ୍-୧ଟି, ୮. ବାଉଁଶିନ୍-୧ ପ୍ୟାକେଟ୍ (୧୦୦ଗ୍ରା), ୯. ମାଲିଆଥୁଅନ୍-(୨୫୦ ମିଲି), ୧୦. କଟର-୧, ୧୧. ଅମ୍ବୋହାଇଗ୍ରେମିଟର-୧ଟି ।

ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

୨୫ ସେମି ଯନ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ୧୦ ସେମି ବହଳର ୬୦ଟି ନଡ଼ାବିଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ବିଡ଼ାକୁ ୨୦-୩୦ ମିନିଟ୍ ପୁଟା ପାଣିରେ ବତୁରାଇବେ । ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା କରିବେ ଏବଂ ନଡ଼ାକୁ ଛାଣିଆଣି ୬୫% ଆର୍ଦ୍ରତା ରଖିବେ । ୧୦ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ତଳେ ଯନ୍ତା ଉପରେ ରଖିବେ, ତା'ଉପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ବୁଣିଦେବେ । ପୁଣି ୧୦ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଦେଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏହିପରି ଭାବେ ୬ଗୋଟି ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ମାଲାଥିୟନ (୦.୧%) ଓ ବାଲିଷନ୍ (୦.୨%) ବେଡ୍ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ । ତା'ପରେ ବେଡ୍‌କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦ୍ଵାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ । ଯନ୍ତାଟିକୁ ନେଇ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ଥିବ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ୍‌ରେ କବକ ଜାଲ ମାଡି ସାରିଲା ପରେ ପଲିଥିନଟିକୁ ଖୋଲିଦେବେ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ୮୦% ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିଚାଳନା କଲେ କଢ଼ ଆସିଯିବ । ମଞ୍ଜି ପକାଇବାର ୧୦-୧୫ଦିନ ପରେ କଢ଼ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :

ପାଳ ଛତୁକୁ ସର୍ବଦା କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ତାହା ଆଉ ୬-୮ ଘଣ୍ଟା ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ । ପାଳ ଛତୁ ୧୦-୧୫° ସେଲସିୟସ୍‌ରେ ରହିପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜରି କଣାକରି ସେଥିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ପାଳ ଛତୁକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେ'ରେ ରଖି ପଲି ପ୍ରୋପାଲିନ୍ କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କାଠର ପେଟି ଭିତରେ ରଖି ଶୁଖିଲା ବରଫ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ । ଚାଇନା ଓ ତାଇୱାନ୍ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଳଛତୁ ପ୍ୟାକିଂକରି ହଂକଂ ଏବଂ ଆଇଲାଣ୍ଡକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ପାଳଛତୁରେ ସ୍ଵଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।

ଅଦିନିଆ ପାଳଛତୁ ଚାଷ

ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିପାରିଛି । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି କୃଷକ, କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳା, ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସୁସ୍ବାଦୁ ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣାବୃଦ୍ଧି, ସହଜ ଓ ସରଳ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିନିଯୋଗରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଚାଷକୁ ସବୁବର୍ଗର କୃଷି ପରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ସ୍ଵଳ୍ପ ସମ୍ବଳ କୃଷି ପରିବାରମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ପରିବାରର ପୋଷଣ ସହିତ କିଛିଟା ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନ ଓ ବର୍ଷାରତ୍ନରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତରତ୍ନରେ (ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଧୂଳିରି ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ପାଳଛତୁର ଚାହିଦା ଓ ଦର ଧୂଳିରି ଛତୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଶୀତଦିନେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ । କାରଣ ଏହି ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ୨୫ରୁ ୩୮° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ ୮୦ରୁ ୮୫ ଶତକଡ଼ା ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହେଲେ ପାଳଛତୁର ଅମଳ କମିଯାଏ । ଏପରିକି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅମଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ଶୀତଦିନେ ପାଳଛତୁ ଚାଷର ଅସୁବିଧା ତଥା ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ଉପଯୋଗୀ

ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲାଣି । ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ତମ୍ବୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ କି ୨୫୦ରୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରୁଥିଲେ ।

ପଲିହାଉସ୍ରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନର ଆକଳନ :

ଅନେକ ସମୟରେ ଛତୁଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଗୃହର କବାଟଟିକୁ ଖୋଲା ରଖାଯିବା ଫଳରେ ବାହାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଡ଼ା ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ପଲିହାଉସ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ପଲିହାଉସ୍ ଭିତରେ ସକାଳ ୧୧ଟା ସମୟରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତୁ ବେତ୍ରର କଡ଼ ପଡିଯିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଥିଲା ।

ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଲିହାଉସ୍ ପଛଟି ସହିତ କେତୋଟି ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । (୧) ପଲିହାଉସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ପଲିହାଉସ୍‌ର ପଛପଟେ ଏକ ଏକ୍‌ଜେକ୍ଟ ପଙ୍ଖା ଲଗାନ୍ତୁ, (୨) ଉତ୍ତାପ କମାଇବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ପଲିହାଉସ୍‌ର ନିମ୍ନଭାଗରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ବହଳ ବାଲିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଦିଆଯାଇ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, (୩) ଏହା ସହିତ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ କରାଯାଉଥିବା ପଲିହାଉସ୍‌ରେ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ମିଳିପାରିବ । ଏହି ପରିମାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗରେ ଶୀତଦିନେ ମଧ୍ୟ ବେତ୍ର ପିଛା ୧ କି.ଗ୍ରା. ପାଳଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ପଲିହାଉସ୍ ଗଠନ :

ସାଧାରଣ ପଲିହାଉସ୍‌ଟିଏ ୨୦ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୧୦ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ୯ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପଲିହାଉସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

- ▶ ୨୦୦ ମାଇକ୍ରନ୍ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା ଭାଷ୍‌ଲେଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଲିଥିନ୍ (୧୦୭ ମିଟର) ।
- ▶ ବାଉଁଶ (ବାଉଁଶର ଫ୍ରେମ୍ ଓ ଭାଡି)
- ▶ ବାଲି ୩ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ।
- ▶ ଏକ୍‌ଜେକ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍
- ▶ ଅମ୍ଫୋହାଇଗ୍ରୋମିଟର ।
- ▶ ପ୍ଲଷ୍ଟିକ୍ ରଶି / ସୁତୁଲି ।

ଏହି ପଲିହାଉସ୍‌ଟି ଏକ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ବାଉଁଶରେ ଏକ ଅବବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତିର ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ୨୦ଫୁଟ, ପ୍ରସ୍ଥ ୨୦ଫୁଟ ଓ ଉଚ୍ଚତା ୯ ଫୁଟ । ତାହା ଉପରେ ଅଲ୍‌ଟ୍ରା ଭାଷ୍‌ଲେଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଲିଥିନ୍‌କୁ ଏପରି ଭାବେ ଆବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପଲିଥିନ୍‌ଟି ଲୋଚାକୁଡ଼ା ନହୋଇ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ୫ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ୨.୫ ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କବାଟକୁ ପଲିଥିନ୍‌ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଲିହାଉସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ପଲିହାଉସ୍‌ର ତଳେ ୩ଇଞ୍ଚ ବହଳର ପରିଷ୍କାର ନିଉବାଲିକୁ ପକାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପଲିହାଉସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗରମ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କବାଟର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୂମିଠାରୁ ହାରାହାରି ୭ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଏକ୍‌ଜେକ୍ଟ ପଙ୍ଖାକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ୨ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ ୩ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୃହର ଆକୃତିକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଲମ୍ବର ତିନି ଆକିଆ ଭାଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ଭାଡିକୁ ପଲିହାଉସ୍‌ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ,

ଯେପରି କି ଏଥିରେ ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ପାଣି ଦେବା ଓ ଛତୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷ ସହଜରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବ । ପଲିହାଉସ୍‌ରେ ଭିତରେ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ମୋହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନେଇ ଉତ୍ତାପ 9° ରୁ 17° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୦ ଓ ୮୫ ଶତକଡ଼ା ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ । ଅଧିକ ଗରମ ହେଲେ ଏକଜଷ୍ଟ ଫଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଗରମ ବାୟୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାଲିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଉତ୍ତାପକୁ କମାଇବା ସହିତ ପଲିହାଉସ୍‌ର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ ।

ପଲିହାଉସ୍‌ ଭିତରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ :

ପଲିହାଉସ୍‌ ଭିତରେ ପାଳ ଛତୁର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ସହିତ ସମାନ ।

- ◆ ପ୍ରଥମେ ପଲିହାଉସ୍‌ଟିକୁ ବ୍ଲିଟିଂ ପାଉଡର / ଫର୍ମାଲିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ବିଶୋଧିତ କରିବେ ।
- ◆ ସେହି ଗୃହରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ଥାକ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଉଁଶର ଭାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।
- ◆ ନଡ଼ାକୁ ସାଇଜ କରି କାଟି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ବତୁରାଇବେ ।
- ◆ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଗରମ ବାମ୍ଫରେ ୩୦ମିନିଟ୍ ରଖି ନଡ଼ାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ ।
- ◆ ତା'ପରେ ନଡ଼ାକୁ ସିଧା କରି ପାଣି ନିଗାଡ଼ିବେ ଯେପରିକି ନଡ଼ାର ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୫ ଶତକଡ଼ା ରୁହେ ।
- ◆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିମ୍ପି ମାଡ଼ିଥିବା ବୋତଲଟିକୁ ଆଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ । ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରି ଚାରିଭାଗ କରିଦେବେ ।
- ◆ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯେ କୌଣସି ଡାଲିଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ତାହାକୁ ଚାରିଭାଗ କରି ରଖିଦେବେ ।
- ◆ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ପରି ନଡ଼ାକୁ ଡାଲିଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ତାହାକୁ ଚାରିଭାଗ କରି ରଖିଦେବେ । ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ୬ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡ଼ାକୁ ଦେବେ । ତା ସହିତ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ ।
- ◆ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରୋଟି ସ୍ତର କରିବେ ଏବଂ ସେକ୍ସରେ ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ବେଡକୁ ୮ରୁ ୧୦ଦିନ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବେ ।
- ◆ ଅର୍ମୋହାଇଗ୍ରୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୃହର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଜାଣି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଉତ୍ତାପ (9° - 17°) ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା (୮୦-୮୫) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ।
- ◆ ମଞ୍ଜି ପକାଇବାର ୧୦-୧୨ ଦିନ ପରେ ବେଡରେ କଳାକଳା କଢ଼ି ଦେଖାଯିବ । ତା'ପରେ ପଲିଥିନ୍‌କୁ ଖୋଲି ସିଆପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ।
- ◆ ଦୁଇାତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଛତୁ ବେଡ୍‌ର ସମସ୍ତ ଛତୁ ଅମଳ କରିପାରିବେ ।
- ◆ ସର୍ବଦା କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳି ଖାଇବେ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି ବଟା କରିବେ ।

ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ :

ପଲିହାଉସ୍‌ଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ

କ୍ର.ନଂ.	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
୧.	ବାଉଁଶ	୨୦ଖଣ୍ଡ	୧,୨୦୦.୦୦
୨.	ପଲିଥିନ୍	୧ (୧୦ x ୬ ମିଟର)	୩,୦୦୦.୦୦
୩.	ଅର୍ମୋହାଇଗ୍ରୋମିଟର	୧	୧,୩୦୦.୦୦

୪.	ଏକକ୍ଷ ପଖା	୧	୧,୦୦୦.୦୦
୫.	ବାଲି	୩ ଇଞ୍ଚ ବହଳର	୦,୨୦୦.୦୦
୬.	ମଜୁରୀ	୪	୪,୪୮୦.୦୦
ମୋଟ୍			୬,୧୮୦.୦୦

ଶୀତଦିନରେ ୧୫ ଦିନରେ ୪୨ଟି ଲେଖାଏଁ ବେଡ୍ ହିସାବରେ ୪ ମାସରେ ୨୯୪ ଟି ବେଡ୍ ପଲିହାଉସ୍ ଭିତରେ ପକାଯାଇ ପାରିବ । ଚାରି ମାସରେ ପଲିହାଉସ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ।

କ୍ର.ନଂ.	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଏକର ପ୍ରତି (ଟଙ୍କାରେ)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
୧.	ନଡ଼ା	୪୪୧୦ କି.ଗ୍ରା.	୦.୭୫/କି.ଗ୍ରା.	୩,୩୦୮.୦୦
୨.	ବିହନ	୨୯୪ ବୋତଲ	୧୨/ବୋତଲ	୩,୫୨୮.୦୦
୩	ବେସନ	୫୯ କି.ଗ୍ରା.	୩୦/କି.ଗ୍ରା.	୧,୭୭୦.୦୦
୪.	ପଲିଥିନ	୫୫ ମିଟର	୨୦/ମିଟର	୧,୧୦୦.୦୦
୫.	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	-	-	୦,୨୦୦.୦୦
ମୋଟ୍				୯,୯୦୬.୦୦

ଏହି ଆୟତନର ପଲିହାଉସ୍‌ରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଜଣେ ବେଡ୍ ପକାଇଲେ ଚାଷୀ ୯,୯୦୬ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବେଡ୍ ପିଛା ୧ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଅମଳ ପାଇ ଚାରିମାସ ଭିତରେ ମୋଟ୍ ୧୨,୩୧୪ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ପଲି ହାଉସ୍‌ଟିକୁ ତିନିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ପଲିହାଉସ୍‌ରେ ପାଳଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କେତୋଟି ତଥ୍ୟ :

- ♦ ପଲିହାଉସ୍‌କୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ ।
- ♦ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କିଛି ପକାଇ ପଲିହାଉସ୍‌ଟିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ ।
- ♦ ପଲିହାଉସ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଡ୍‌କୁ ପଲିହାଉସ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପକାଇବେ ।
- ♦ ଯୋକ ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଲିହାଉସ୍‌ଟିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ ।



ଧୂଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ

ଆମ ଦେଶରେ ଶାମୁକା ଛତୁକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧୂଙ୍ଗିରି ଛତୁ କୁହାଯାଏ । ଛତୁର ଆକୃତି ଶାମୁକା ଭଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶାମୁକା ଛତୁ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି । ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଶାମୁକା ଛତୁ ଚାଷ ମହୀଶୂରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପଗ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ବା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଏସିଆ, ଲତ୍ତରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାର ୨୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ଶାମୁକା ଛତୁ କେବଳ ଚୀନ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ଶାମୁକା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା କେତେକ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଶାମୁକା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ୪,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯାହା ସମୁଦାୟ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ । ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାମୁକା ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରେ ।



ଶାମୁକା ଛତୁର ବିଶେଷ ଗୁଣ :

- ✦ ଶାମୁକା ଛତୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କିସମ ଉପଲବ୍ଧ । ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କିସମ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ।
- ✦ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଛତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାମୁକା ଛତୁକୁ ସର୍ବାଧିକ କୃଷିଜାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପଯୋଗ କରି ସଫଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
- ✦ ଶାମୁକା ଛତୁର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ ଓ ସରଳ ।
- ✦ ପାଳଛତୁ ତୁଳନାରେ ଶାମୁକା ଛତୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ । ଅମଳ ପରେ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ଏହାକୁ ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।
- ✦ ଶାମୁକା ଛତୁର ଉତ୍ପାଦିତା ଶକ୍ତି ବା ଜୈବବିକ୍ଷତା ସମସ୍ତ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଛତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ (୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ) ।
- ✦ ଫସଲ ଅବଧି ଦୁଇଛତୁ ତଥା ବୋତାମ ଛତୁଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ (୨୧ଦିନ) ।
- ✦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଶାମୁକା ଛତୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳବାୟୁ :

ତାପମାତ୍ରା : ଶାମୁକା ଛତୁ ସାଧାରଣତଃ ୨୦ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ, ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଶାମୁକା ଛତୁର କିସମରୁତିକୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା (୧୦ରୁ ୨୦° ସେଲସିୟସ୍) ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ତାପମାତ୍ରା (୧୦ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍) ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏହି ପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ । ସିଟ୍ରିନୋପାଇଲିଆଟସ୍, ଜାମୋର, ଜସସ୍, ପ୍ଲୁବେଲାଟସ୍, ପ୍ଲୁଟିପସ୍ ଏବଂ ସଜୋର-କାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣକୋପି, ଏରାଇଞ୍ଜି, ପ୍ଲୋରିଡା, ଫସ୍ତୁଲାଟସ୍, ଅଷ୍ଟିଆଟସ୍ ଏବଂ ନୀଳ ଶାମୁକା ଛତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇପାରେ ।

ଆର୍ଦ୍ରତା : ଶାମୁକା ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ୭୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଶୀତଦିନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ରହିଲେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଛତୁଘରର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଆଲୋକ : ଶାମୁକା ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଲୋକ (୨୦୦ ଲକ୍ଷ) ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ, ଛତୁ ଫିମ୍ପିର ଦୈନିକ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ (ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ପକାଇବାର ପ୍ରଥମ ୧୫ଦିନ) ଆଲୋକ ପ୍ରାୟ ଦରକାର ହୁଏନାହିଁ ।

ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ : ଶାମୁକା ଛତୁର ଦୈନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ସମୟରେ ଛତୁ ଗଠନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର । ତେଣୁ ଛତୁ ଫଳିବା ସମୟର ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଘରେ ରଖାଯାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ :

ନଡ଼ା : ଉନ୍ନତମାନର ଧାନ ନଡ଼ା ବ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତି ୧.୫ରୁ ୨.୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଧାନ ନଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଗହମ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ନଡ଼ା, ମକା, ଜୋହାର । ବାଜରାର ଶୁଖିଲା କାଣ୍ଡ ବା ପତ୍ର, ଆଖୁଛେଦା, ଛୋଟ ବା ଲୁଗା କଳର ମଇଳା, ଚିନାବାଦାମ ଖୋଳପା, ଶୁଖିଲା ଘାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଅଳସୀ, ରାଶି, ସୋରିଷ ଇତ୍ୟାଦିର ଶୁଖିଲା କାଣ୍ଡ, ବ୍ୟବହୃତ ତା ପତ୍ର ବା ବ୍ୟବହୃତ କାଗଜ ଉପଯୋଗ କରି ଶାମୁକା ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଛତୁ ବିହନ : ତିନି ସପ୍ତାହରୁ ଏକମାସର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବିହନ (ଶୁଖିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ) ଶାମୁକା ଛତୁର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାବ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ବିହନ ଉନ୍ନତ ମାନର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ସ୍ବାକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ୍ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ଭିତ୍ତିରେ କିସମ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଜୈବିକ ପରିପୂରକ : ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କେତେଗୁଡିଏ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗହମ ଚୋକଡ଼, ଧାନକୁଣ୍ଡା, ସୋୟାବିନ୍ ବା ଚିନାବାଦାମ ପିଡିଆ, ମକା ଗୁଣ୍ଡ, କୋଳଥ ଗୁଣ୍ଡ, କୁକୁଡ଼ା ଖତ, ସିଝା ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ । ଶୁଖିଲା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବା ବ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତି ୧୫୦-୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଶାମୁକା ଛତୁ ଫିମ୍ପିର ମୃତୋପକାବି କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମାଧ୍ୟମର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ।

ପଲିଥିନ୍ ଅଳୀ : ୮୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଓ ୪୦ ସେ.ମି. ଓସାରର ୧୨୫ରୁ ୧୫୦ ଗେଜର ତଥା ଧଳାରଙ୍ଗର ଦୁଇପଟ ଖୋଲାଥିବା ଅଳୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ୬୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଓ ୪୫ସେ.ମି. ଓସାରର ବ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ବ୍ୟାଗକୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଗାଷ ପ୍ରଣାଳୀ :

ନଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ : ଉନ୍ନତ ମାନର ନଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ନଡ଼ା କଟା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ୧.୫ରୁ ୨ଇଞ୍ଚ (୪ରୁ ୫ ସେ.ମି.) ଆକାରରେ କଟାଯାଏ । କଟା ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ୬ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ତେବେ, ବିଭିନ୍ନ କିଷମର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ବତୁରାଇବା ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ନଡ଼ାକୁଥଣ୍ଡା ପାଣିରୁ ଛାଣି ଶୁଖିଲା ତଥା ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ । ନଡ଼ାରୁ ପାଣି ନିଗିଡି ଗଲାପରେ ବତୁରା ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ବିଶୋଧନ ରୂପରେ ନଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣି ଅଥବା ବାଷ୍ପରେ ଏକଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରେ । ରାସାୟନିକ ବିଶୋଧନ ଭାବରେ ନଡ଼ା ବତୁରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରତି ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୭ ୧୨୫ ମିଲିଲିଟର ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ନଡ଼ାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରାଯାଇପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦୂୟା ଫିମି ବା ବାଜାଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ, ରାସାୟନିକ ଉପଚାର ତୁଳନାରେ ଅଣରାସାୟନିକ ଉପଚାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ବିଶୋଧନ ପରେ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ଶାନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ନଡ଼ାର ଜଳାୟ ଅଂଶ ୫୫ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଡ଼ାକୁ ସମାନ ଚାରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ।

ବିହନ ସଂଗ୍ରହ : ଅଗ୍ରଭାଗ ବଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର ତଥା ବିଶୋଧିତ ଲୁହା ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋତଲ ମଧ୍ୟରୁ ବିହନକୁ କାଢ଼ି ତାହାକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ।

ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି : ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦରସିଝା ଗହମ ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଆଂଶିକ ବିଶୋଧିତ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମାନ ଚାରିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ।

ବ୍ୟାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି : ପଲିଥିନ ଥଳାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନଡ଼ାକୁ ୧୫ସେ.ମି. ବା ୬ ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ପକାଇ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଆଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଭାଗ ବିହନକୁ ନଡ଼ା ଉପରେ ବ୍ୟାଗର ଧାରକୁ ଲାଗି ସମାନ ଭାବରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ବିହନ ଉପରେ ଏକ ଭାଗ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ସମାନ ବହଳର ନଡ଼ା ପକାଇ ସାମାନ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବିହନ ତଥା ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ପୁନଶ୍ଚ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଭାଗରେ ଏହା ଉପରେ ୧୫ସେମି ବା ୬ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନନା ଦେଇ ଦୁଇଭାଗ ମଞ୍ଜି ୭ ୨ଭାଗ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ



ନିମ୍ନର ସମସ୍ତ ଉପରି ଭାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତଥା ୫ସେ.ମି. ବା ୨ ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ନଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେବାକୁ ପଡେ । ତିନୋଟି ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାରି ଭାଗ ବିହନକୁ ଉପଯୋଗକରି ଚାରୋଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନଡ଼ା, ବିହନ ଓ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭବରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରେ । ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ପାଦିକତା ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମାନ । ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୦-୧୫ଟି କଣା ଏକ ପରିଷ୍କାର ଫୋଡ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଲୋକ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ :

ବ୍ୟାଗ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରାୟ ୧୫ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁର କବଳ ଜାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ାକୁ ଆଛାଦିତ କରେ । ଏହି ସମୟରେ ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ତଥା ଟାଣ ହୋଇଥାଏ । ପଲିଥିନ୍ ଚଳପାଖ ଖୋଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ପଡେ । ତେବେ, ପଲିଥିନ୍ ଟିକୁ କାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ । ତାପରେ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛତୁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ଓ ପବନ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ପରିବେଶରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ । ଝୁଲାଇବାର ପରଦିନଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ତଥା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଛତୁ ଅମଳ : ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ଝୁଲାଇବାର ୪-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ମାନ ଚାରିପଟକୁ ବାହାରେ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩-୪ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ । ଛତୁର ଧାର ଭିତରପଟକୁ ମୋଡ଼ିହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋଳିନେବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟଥା ଛତୁରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅମଳ ପରେ ପ୍ରତି ୭-୮ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛତୁ ମିଳେ । ତେବେ, ପିଣ୍ଡୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଓଦା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାମୁକା ଛତୁର ସମୁଦାୟ ଫସଲ ଚକ୍ର କିସମ ବିଶେଷରେ ୪୫-୬୦ ଦିନ । ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ନଡ଼ାର ସମ ପରିମାଣର ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ବ୍ୟାଗ ପିଛା ୧.୫ରୁ ୨.୦ କିଲୋ ଛତୁ ଅମଳ କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଶାମୁକା ଛତୁର ଉତ୍ପାଦିକତା ଶକ୍ତି ବା ଜୈବଦକ୍ଷତା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ । ଅବଶ୍ୟ, କିସମ ବିଶେଷରେ ଜୈବଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଆୟ ବ୍ୟୟ : (୮୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଓ ୪୦ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତି)

ବ୍ୟାଗ ପ୍ରତି ଛତୁ ଆଦାୟ - ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. (ହାରାହାରି)

ବିକ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟ - ଟ. ୬୦.୦୦ (କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଟ. ୪୦.୦୦ ହାରରେ)

ନେଟ୍ ଲାଭ (ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତି) - ଟ. ୩୦.୦୦ (ପ୍ରତି ୪ ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନରୁ)

ଶାମୁକା ଛତୁର କେତେକ ଉନ୍ନତ କିସମ :

ସଜୋର କାକୁ : ଛତୁର ବର୍ଷ ଧୂସର । ନଡ଼ା ଉପରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍, ପୃଥକ୍ ବାହାରେ । ଛତୁର ସ୍ବାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଅନନ୍ୟ । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କିସମ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀଯୋଗ୍ୟ । ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଜୈବଦକ୍ଷତା ୭୫ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ।

ଫ୍ଲୋରିଡ଼ା : ଛତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଛତୁ ମାଂସଳ ଏବଂ ପେଚୁରେ ବାହାରେ । ଏହା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଓ ଏହାର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ । ନିକଟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

କ୍ର.ନଂ.	ସାମଗ୍ରୀ	ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ(ଟଙ୍କା)
୧.	ନଡ଼ା	୨.୦ କି.ଗ୍ରା.	୦୪.୦୦
୨.	ବିହନ	୨୦୦ଗ୍ରାମ୍	୧୨.୦୦
୩.	ସିଝା ଗହମ	୨୦୦ଗ୍ରାମ୍	୧୨.୦୦
୪.	ପଲିଥିନ୍ ଥଳି	୧ଟି	୦୨.୦୦
୫.	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ	--	୦୮.୦୦
ମୋଟ ବ୍ୟୟ		ଟ.	୩୦.୦୦

ପ୍ଲୁବେଲାଟସ୍ : ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମାଂସଳ । ଛତୁ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ । ଟୋପିର ଆକାର ବଡ଼ ଏବଂ ଛତୁ ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରେ । ଏହାର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୭୫ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ।

ସିଟ୍ରିନୋପାଇଲିଆଟସ୍ : ଛତୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, କମ୍ ମାଂସଳ ତଥା ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରେ ଏହାର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୬୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ।

ଇଓସ୍ : ଛତୁ ଲସଡ଼ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର । ଛତୁର ଆକାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଛୋଟ ତଥା ଏହା ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ସ୍ବାଦଯୁକ୍ତ କିସମ । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ । ଏହା ଜୈବଦକ୍ଷତା ୬୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ।

ନୀଳ ଶାମୁକା ଛତୁ : ଛତୁର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଟୋପି ଆକାରରେ ବଡ଼ ତଥା ଖୁବ୍ ମାଂସଳ । ଛତୁ ସ୍ବାଦଯୁକ୍ତ ତଥା ନରମ । ଏହା ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏବେ ଉକ୍ତ କିସମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଛତୁର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀତରତ୍ନରେ ଉପଯୋଗୀ ।

ଅଷ୍ଟିଆଟସ୍ : ଛତୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଧୂସର, ଆକାର ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ବାଦ ତଥା ଗନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଭଲ । ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶୀତରତ୍ନରେ ଉପଯୋଗୀ । ଏହାର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୭୫ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ।

କର୍ଣ୍ଣୁକୋପି : ଛତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ, ମାଂସଳ, ଲସଡ଼ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ନଡ଼ା ଉପରେ ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଶୀତଦିନିଆ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କିସମ । ଏହାର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୬୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ।

ପ୍ଲୁଟିପସ୍ : କିସମର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ । ପେନ୍ଥାରେ ବାହାରେ । ସୁସ୍ବାଦୁକର ଓ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ । ଏହାର ଜୈବଦକ୍ଷତା ୬୦ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ।



ଛତୁର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ

ଛତୁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷତଃ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ । ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ କମ୍ ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ, ମାଂସ ଭଳି ଗୁରୁପାକ, ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଛତୁ ଗ୍ରହଣକରିବା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର । ଛତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଯାହାକି ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଛତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିବା ମାଂସ (Vegetable Meat) ବୋଲି କୁହନ୍ତି ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛତୁରେ ଥିବା ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ (ଗ୍ରା/୧୦୦ ଗୁଣ୍ଠା ଛତୁରେ)

କ୍ର.ନଂ. ଛତୁ	ଶ୍ୱେତସାର	ପୁଷ୍ଟିସାର	ସ୍ନେହସାର	ତତ୍ତ୍ୱ	ଭସ୍ମ	ଶକ୍ତି(କି.କ୍ୟା.)
୧. ପାଳ ଛତୁ (Vegetable Meat)	୫୪.୮୦	୩୭.୫୦	୨.୬୦	୫.୫୦	୧.୧୦	୩୦୫
୨. ଧୂଳିରି ଛତୁ (Pleurotus sajorcaju)	୬୩.୫୦	୧୯.୨୩	୨.୭୦	୪୮.୬୦	୫.୩୨	୪୧୨
୩. ଦୁଧ ଛତୁ (Calocybe indica)	୬୪.୨୬	୧୭.୬୯	୪.୧୦	୩.୫୦	୭.୫୩	୩୯୧
୪. ବୋତାମ ଛତୁ (Agaricus bisporus)	୪୬.୧୭	୩୩.୫୮	୩.୧୦	୨୦.୯୦	୫.୭୦	୪୯୯
୫. କଳାକାନି ଛତୁ (auricularia auricula)	୮୨.୮୦	୦୫.୨୦	୮.୩୦	୧୯.୮୦	୫.୭୦	୩୫୧
୬. ସିଟାକେ (Lentinula edodes)	୪୭.୬୦	୩୨.୯୩	୩.୭୩	୨୮.୮୦	୫.୨୦	୩୮୭

ସଦ୍ୟ ଛତୁରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟପ୍ରାଣ

କ) ବିଭିନ୍ନ ଛତୁରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ (୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସଦ୍ୟ ଛତୁ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ)

ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ	ପାଳଛତୁ	ଧୂଳିରି ଛତୁ	ବୋତାମ ଛତୁ
ଜଳୀୟ ଅଂଶ	୫୧.୦୮	୮୯.୭୨	୮୯.୯୩
ଶ୍ୱେତସାର	୦.୧୨	୦.୫୧	୨.୫୧
ସ୍ନେହସାର	୦.୫୧	୦.୯୨	୦.୮୬
ପୁଷ୍ଟିସାର	୩.୦୭	୪.୫୯	୩.୧୭
ତତ୍ତ୍ୱ ଜାତୀୟ	୦.୫୯	୦.୬୧	୦.୧୪
ଧାତବ ଲବଣ	୦.୯୦	୦.୯୩	୧.୬୮
ଭିଟାମିନ୍ 'ସି' (ମି.ଗ୍ରା.)	୧୨.୨୫	୨୭.୬୦	୨୮୮

ବିଭିନ୍ନ ଛତୁରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ (୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଛତୁ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ)

ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ	ପାଳଛତୁ	ଧୂଳିରି ଛତୁ	ବୋତାମ ଛତୁ
ଜଳାୟ ଅଂଶ	୯୦.୪	୯୦.୦	୮୯.୫
ଶ୍ୱେତସାର	୫୭.୪	୫୮.୦	୬୭.୫
ସ୍ୱେଦସାର	୨.୬	୧.୭	୧.୮
ପୁଷ୍ଟିସାର	୨୮.୫	୧୮.୫	୨୬.୩
ତତୁ ଜାତୀୟ	୧୭.୪	୧୧.୫	୧୦.୪
ଭସ୍ମ	୧୧.୫	୯.୩	୧୨.୦

ବିଭିନ୍ନ ଛତୁରେ ଥିବା ଧାତବ ଲବଣ (୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଛତୁରେ ଥିବା ଧାତବ ଲବଣ ମିଳିଗ୍ରାମରେ)

ଛତୁର ନାମ	କ୍ୟାଲସିୟମ୍	ଫସ୍ଫରସ୍	ଲୌହ	ସୋଡିୟମ	ପଟାସ୍
ପାଳଛତୁ	୨୧	୬୭୭	୧୭.୧	୩୭୪	୩୪୫୫
ଧୂଳିରି ଛତୁ	୯୮	୪୭୭	୮.୫	୬୧	-
ବୋତାମ ଛତୁ	୨୩	୪୨୯	୧.୨	-	୪୭୬୨

ବିଭିନ୍ନ ଛତୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ (୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଛତୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଗ୍ରାମରେ)

ଛତୁର ନାମ	ଥାୟାମିନ୍	ରିଟାବଫ୍ଲୋବିନ୍	ନିୟାସିନ୍	ଆସକରବିନ୍
ପାଳଛତୁ	୧.୨	୩.୩	୯୧.୯	୨୦.୨
ଧୂଳିରି ଛତୁ	୪.୮	୪.୭	୧୦୮.୭	୦.୦
ବୋତାମ ଛତୁ	୧.୧	୫.୦	୫.୨	୮୧.୯

ବିଭିନ୍ନ ଛତୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ପରିମାଣ ଗ୍ରାମ / ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟିସାର

ଆମିନୋ ଏସିଡ୍	ପାଳଛତୁ	ଧୂଳିରି ଛତୁ	ବୋତାମ ଛତୁ
ଲିଉସିନ୍	୪.୫	୭.୦	୬.୫
ଆଇସୋଲିଉସିନ୍	୩.୪	୪.୪	୪.୫
ଭାଲିନ୍	୫.୪	୫.୩	୨.୫
ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫ୍ୟାନ	୧.୫	୧.୨	୨.୦
ଲାଉସିନ୍	୭.୧	୫.୭	୯.୧
ଥ୍ରୋନିନ୍	୩.୫	୫.୦	୫.୫
ଫିନାଲ୍ ଆଲାନିନ୍	୨.୬	୫.୦	୪.୨
ମେଥ୍ରୋନିନ୍	୧.୧	୧.୮	୦.୯
ହିଷ୍ଟିଡିନ୍	୩.୮	୨.୨	୨.୭
ସମୁଦାୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍	୩୨.୯	୩୭.୧	୩୮.୯

ଛତୁରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଓ ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ

ଛତୁ	ଉପାଦାନର ଅବସ୍ଥିତି	ଫଳାଫଳ
ରିସି ଛତୁ (Gandoderma Lucidum) ବାସିଲୋଗ୍ଲୁକାନ, ପେଷାଗ୍ଲୁକଜନ୍	ପଲିସାକାରାଇଡ୍ସ ଆଭିନୋସାଇନ୍, ପଲିଗ୍ଲୁକଜନ୍, ଇରାଭିନିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେପାଟାଇଟିସ୍	ଭୂତାଶୁକନିତ ରୋଗର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଆଣ୍ଡ ଏଡ୍‌ଆଇଭି,
ଧୂଳିରି ଛତୁ (Pleurotus Ostreatus)	ଲୋଭାଷିନ୍	ମାଂସପେଶୀ ଓ ଆଶ୍ମଶୁଶ୍କି ବ୍ୟଥା ତଥା କ୍ୟାନ୍‌ସରର ଉପଶମ
ପାଳଛତୁ Volvariella Spp.	ଭଲ ଭାଟକ୍‌ସିନ୍ ପ୍ଲୁମ୍‌ବୁଟକ୍‌ସିନ୍	ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ
ବ୍ଲୁକ୍ ଇରା (Auricularia)	ଆଭିନୋସାଇନ୍	ମଳ କଞ୍ଚକ, ରକ୍ତଚାପ
ସିଟାକ୍ ଛତୁ (Lintinula eodes)	ହିରୁସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲେଣିନିନ୍	ରକ୍ତଚାପ, ହାଇପରଏସିଡିଟି କ୍ୟାନ୍‌ସର
ସିଟାକେ ଛତୁ (Grifola frondos)	ପ୍ରୋଟିକ୍ ଓ ପ୍ଲାକାନ, ଗ୍ଲାଇକୋପ୍ରୋଟିନ୍, ପଲିସାକାରାଇଡ୍	ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ବଦହଜନି, କ୍ୟାନ୍‌ସର

ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ବ୍ୟତୀତ ଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

ଛତୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ :

- ♦ ଛତୁରେ ଶର୍କରା ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ୍ୟ ରୂପେ କାମ ଦିଏ ।
- ♦ ଛତୁ ଅଳ୍ପ କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହୃଦ୍‌ରୋଗୀ ଓ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ । କାରଣ ଏଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିର୍ମାଣ ଓ ସୋଡିୟମ କମ୍ ଥାଏ । ଛତୁରେ ଥିବା କେତେକ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ରକ୍ତରେ ଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏଲଡିଏଲ୍ ଚର୍ବିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ସେବନର ଖରାପ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
- ♦ ଛତୁରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଓ ଡିଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ବହୁମୁତ୍ତ ରୋଗୀ ଓ ସ୍ତୁଳକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ଅଟେ ।
- ♦ ଛତୁରେ ଟ୍ରିପ୍‌ସିନ୍ ଜାତୀୟ ଏନ୍‌ଜାଇମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିହୁଏ । ଏଣୁ ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ରୋଗୀ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
- ♦ ଶରୀରରେ ଆର୍କଏନ୍‌ଏର ଅଭାବ ହେଲେ ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଛତୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଆର୍କଏନ୍‌ଏ ଡିଆରି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଶରୀରକୁ ସଚେତ ରଖେ ।
- ♦ ଛତୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ‘କ’ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ରୋଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ♦ ଛତୁରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି-୧ ୨ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ।
- ♦ ଛତୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ‘ଇ’ ଥିବାରୁ ଏହା ଚର୍ମରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରେ । ଦୃତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ ଓ କ୍ଷତ ପାଇଁ ସହାୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

- ◆ ଛତୁରେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ କୌହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରର ଏନୋମିଆ ବା ଶକ୍ତିହୀନତା ଦୂର କରିଥାଏ ।
- ◆ ଛତୁରେ ଥିବା ପଟାସ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦେହରେ ଥିବା ଲୁଣର କ୍ଷତିକାରକ ଶକ୍ତିର ଭାରସାମ୍ୟ ଆଣିଥାଏ । ଏଣୁ ଏହା ଅମ୍ଳରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ।
- ◆ ଛତୁରେ ତନ୍ତୁ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା କୋଷକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରେ । ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ବଦ୍ଧଜମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ◆ କେତେକ ଛତୁରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ୟୁମର ଓ ଏଡ୍ସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ।
- ◆ ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଜି, ଆଜମା ଓ ଥଣ୍ଡା ଆରୋଗ୍ୟ କରାଏ ।
- ◆ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ପ୍ରାସ୍ତବୟସ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଦିନକୁ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଶୁଖିଲା ଛତୁ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ



ଛତୁରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ



ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଛତୁରାସ ଏକ ଆଖୁଦୃଶିଆ ଚାଷ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି । ୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ଜେଜିନାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲାଭାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚାଷର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ଟନରୁ ଅଧିକ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଅଛି । ପ୍ରାୟତଃ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୯୮% ଲୋକମାନେ ଛତୁକୁ ଚଟକା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଖ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କଲକତାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ଷାଦିନେ ଛତୁ ବାହାରକୁ ନଯାଇପାରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଛତୁ ବଜାରରେ ଅଧିକ ହେଲେ ବଜାରର ଦର ବେତ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ କମିଯାଉଛି । ତେଣୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟହୋଇ ତାକୁ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଶୀତଦିନେ ଧିଁରି ଛତୁ କରିବା ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କମ୍ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଦର ଖସିଯାଏ, ସମୟେ ସମୟେ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ୪ମାସ ଛତୁ ଚାଷ ନକରି ବସିଯାଆନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖୁ ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିଁରି ଛତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ, ଚାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା ଛତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଳଛତୁ ଓ ଧିଁରି ଛତୁ ଅନ୍ୟତମ । ଧିଁରି ଛତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ଓ ବଜାରର ଚାହିଦା କମ୍ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ସହିତ ବିକ୍ରିବଟା କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିପରିବା ଭଳି ଛତୁକୁ ଅଧିକ ସମୟ ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇତି ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଛତୁକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅମଳ ନକରାଯିବ, ତେବେ ତାହାର ମାନ, ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବାର ଅବଧି କମିଯିବ, ଜଳାୟ ଅଂଶ ଉଡ଼ି ଶୁଖି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାର ରସ, ସ୍ୱାଦ ଆଉ ନରହି ଛତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଛତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରିଲେ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ବଜାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଛତୁର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଥା ଛତୁକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ତୋଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଛତୁର ବଜାର ଚାହିଦା ରହିଅଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ପାଳ ଛତୁ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳି ୮-୧୦ ଘଣ୍ଟା, ଧିଁରି ଛତୁ ୨-୩ଦିନ, ଦୁଧ ଛତୁ ୪-୫ ଦିନ, ବୋତାମ ଛତୁ ୫-୬ଦିନ ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି । ଫିଙ୍ଗରେ ଛତୁ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଛତୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ପାଳ ଛତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଙ୍ଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ଫିଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ସଂଗେ ସଂଗେ ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେ ନାଳୁଆ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଛତୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

- ♦ ଛତୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୋଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବେଡ୍ ବା ବ୍ୟାଗରୁ ଏମିତି ତୋଳିବେ ଯେପରି ଛତୁର କିଛି ଅଂଶ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି (ନଡ଼ା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ)ରେ ନ ରୁହେ । ବ୍ୟାଗ୍ ବେଡ୍ରେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଛତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ।
- ♦ ଛତୁ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲି, ନଡ଼ା, କୁଡ଼ା, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦିକୁ କାଢ଼ି ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ♦ ଛତୁକୁ ଆଣି ଫୁଟା, କଡ଼, ଦାଗ ଲଗା, ରୋଗିଣୀ ଛତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବେ ଓ ନଷ୍ଟ ଛତୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ । ତା'ପରେ ଛତୁକୁ ଆଣି ଛୋଟ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଗ୍ରେଡିଂ କରିବେ । ତାହାକୁ ଗ୍ରେଡ୍-୧, ଗ୍ରେଡ୍-୨ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇପାରିବେ ।
- ♦ ଛତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକିଂ (କଣା ପଲିଥିନ, ପ୍ଲଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍, କାଠ ପେଟି ଇତ୍ୟାଦି) କରି ବଜାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ । ପ୍ୟାକିଂ ସର୍ବଦା ଆୟୁର୍ବୃଦ୍ଧିଆ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ଲେବଲିଂ କରି ବଜାରକୁ ପଠାଇଲେ ଏହାର ବଜାରଦର ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ।

ପାଳ ଛତୁ :

ପାଳ ଛତୁ ସତେଜ ରହିବାର କ୍ଷମତା ୬-୧୦ ଘଣ୍ଟା । ପାଳ ଛତୁକୁ ସର୍ବଦା କଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳିବେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଳ ଛତୁ ୬-୮ ଘଣ୍ଟା ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ । ଫୁଟା ଛତୁ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବଜାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ । ପାଳ ଛତୁ ତୋଳି ସାରିବା ପରେ ଏଥିରୁ ବାଲି କୁଟା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରି ସଫା କରିଦେବେ ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କଣାଥିବା ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ୧୦-୧୫° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଧୂଳିରି ଛତୁ :

ଧୂଳିରି ଛତୁର ଅଗ୍ରଭାଗ ମୋଡି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୋଳି ଦେବେ । ସେଥିରୁ ବାଲି ଓ କୁଟାକୁ ଝାଡ଼ି ପରିଷ୍କାର କରି ୧୦୦ ଗେଜ୍ ମୋଟେଜ କଣା ଜରିରେ ଛତୁ ରଖିବେ ଯାହାକି ସତେଜ ରହିପାରିବ । ଧୂଳିରି ଛତୁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ୨-୩ ଦିନ ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ । ଧୂଳିରି ଛତୁକୁ କଣା ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ୮-୧୦° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ୬-୮ ଦିନ ସାଇତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।

ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର :

- ୧) ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ (Short term Preservation)
- ୨) ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ (Long term Preservation)

୧. ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ :

ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌରସି ପରିପକ୍ୱ ଓ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ୨-୩ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଛତୁରେ ୨-୩ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । କେବଳ ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ (Citric Acid) ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫାଲେଟ୍ (KMS) ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି ।

ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା (Steeping Method)

ପ୍ରସ୍ତୁତି : କଡ଼ି ଛତୁକୁ ଆଣି ପରିକୋର ଭାବେ ଧୋଇଦେବେ । ସେଥିରେ ୦.୧% ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ୦.୦୫% ପୋଟାସିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫାଲେଟ୍ରେ ପକାଇ ୫ ମିନିଟ୍ ଫୁଟାପାଣିରେ ଛାଣିଦେବେ । ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ ।

ଏକ ମିଶ୍ରଣରେ (୧୫% + ୦.୦୧% ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ + ୦.୦୫ ପୋଟାସିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫାଲେଟ୍) ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବେ । ଏହାକୁ ଏକ ପଲିପ୍ରୋପାଇଲ୍ ଅଳି କିମ୍ବା ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ଜାର ଭିତରେ ରଖିବେ ।

୨. ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ :

ଏହି ଉପାୟରେ ଛତୁକୁ ୬-୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛତୁକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ବାଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ । ଛତୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଦୁଧ ଛତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛତୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଛତୁ କିମ୍ବା ଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଛତୁରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖାଯାଇ ପାରେ ।

ଛତୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ସହିତ ଏହାର ସ୍ବାଦ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ।

♦ ଶୁଖିଲା ଛତୁ (Dried / Dehydrated Mushroom) -

ସାଧାରଣତଃ ଧୂଳିରି ଛତୁକୁ ଶୁଖାଇ ରଖିବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ । ଛତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶୁଖାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।

♦ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶୁଖାଇବା (Sundrying) -

ଛତୁକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସଫାକରି ୦.୦୫% ପୋଟାସିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫାଟ୍ ଓ ୦.୧% ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ଡବାରେ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ରେ ରଖାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତୁର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକୃତି ଠିକ୍ ରହେ ।

♦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡ୍ରାଇଂ (Cabinet Drying) -

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ୬୦ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଛତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଶୁଖିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମାନ ଭାବରେ ଛତୁ ଶୁଖିପାରେ ନାହିଁ ।

♦ ଫ୍ରିଜ୍ ଡ୍ରାଇଂ (Fridge Drying) -

ଛତୁକୁ ୦.୦୫% ପୋଟାସିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫାଟ୍ରେ ବୁଡ଼ାଇ କରି ୬° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ଶୀତଳୀକରଣରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତୁର ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ।

♦ ସୌରଚାଳିତ ଶୁଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ର (Solar Drying) -

ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛତୁକୁ ଶୁଖାଇ ପଲିପ୍ୟାକ୍ କରି ଅଧିକ ଦିନ ରଖାଯାଏ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁକୁ ଶୁଖାଯାଇ ନା କାହିଁକି ଛତୁରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଜଳ (୧%) ରହିବା ଦରକାର ।

ଛତୁ ଆଚାର (Mushroom Pickle) :

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ-

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଛତୁ	୫୦୦ଗ୍ରା	ସୋରିଷ ତେଲ	୭୫ଗ୍ରା.
ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡାସସ୍	୨୦ଗ୍ରା	ଜିରାଗୁଡ଼	୧୦ଗ୍ରା.
ତେକୁଳି ମଣ୍ଡାସସ୍	୨୦ଗ୍ରା	ହଳଦୀ	୧୦ଗ୍ରା.
ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାତି	୫ଗ୍ରା	ଲୁଣ	ସ୍ବାଦଅନୁଯାୟୀ
ଭିନେଗାର	୩୦ମିଲି	ହେଙ୍ଗୁ	୧ଗ୍ରା.
ସୋଡିୟମ୍ ବେନଜୋଏଟ୍	୧ଗ୍ରା.	ଚିନି	୧୦ଗ୍ରା.



ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ :

ଛତୁକୁ ଆଣି ପରିକାର ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇ (୧୦ମିନିଟ୍) ଧୋଇଦେବେ । ଛତୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚିପୁଡ଼ି ଯେପରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୁଖାଇ ଦେବେ । କଡେଇରେ ୫୦ଗ୍ରାମ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ତେଜୁ ପକାଇବେ । ପରେ ପରେ ଛତୁକୁ ପକାଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ୫ମିନିଟ୍ ଭାଜିବେ । ପରେ ପରେ ତେଜୁଳି ମଣ୍ଡ / ସସ୍ ପକାଇ ଆଉ ୫ ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିବା ପରେ ଜିରାଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଉ ୫ ମିନିଟ୍ ଭାଜିବେ । ଛତୁ ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୋରିଷ ମଣ୍ଡ / ସସ୍, ଭିନେଗାର ପକାଇବେ । ଏହା ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଆଉ ୨ ମିନିଟ୍ ଏପଟସେପଟ କରିବେ । ଛତୁକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଗରମ ମସଲା ପକାଇବେ । ଅଳ୍ପ ଚିକିଏ ଭିନେଗାରରେ ସୋଡିୟମ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ କୁ ଗୋଳି ଛତୁ ଆଚାରରେ ମିଶାଇ ଦେବେ । ଆଗରୁ ବିଶୋଧିତ ବୋତଲରେ ଗରମ ତେଲ ୨୫ଗ୍ରାମକୁ ପକାଇ ତା'ଉପରେ ଛତୁ ଆଚାରକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, ଯେପରିକି ଛତୁ ଆଚାର ଠିପିକୁ ନ ଲାଗେ । ଏହି ଆଚାର ୬-୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ (ଛତୁ ଆଚାର) :

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଛତୁ	୧୦୦୦ ଗ୍ରା	ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ	୩୫ ଗ୍ରା	ହଳଦୀ ପାଉଡର	୨୦ ଗ୍ରା.
ଲଙ୍କା ପାଉଡର	୧୦ ଗ୍ରା	ଜିରାପାଉଡର	୧୫ ଗ୍ରା	ଧନିଆ ପାଉଡର	୧୫ ଗ୍ରା
ଶୋରିଷ ତେଲ	୨୦୦ ଗ୍ରା	ଲୁଣ	ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ		

ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଛତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ସଫା କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ । ତା'ପରେ ୦.୦୫% ପୋଟାସିୟମ୍ ମେଟାବାଇସଲଫାଲେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ୫ ମିନିଟ୍ ବୁଝିଜା କରିବେ । ଏହି ବୁଝିଜା ଛତୁକୁ ୨-୩ଥର ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇବେ । ତା'ପରେ ୧୦% ଲୁଣ ପକାଇ ରାତିସାରା ରଖିବେ । ତା'ପର ଦିନ ଅଧିକା ପାଣିକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ । ତା'ପରେ ସମସ୍ତ ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ । ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ପକାଇ ବୋତଲରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବେ । ଯାହାକି ଏକବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି ।

ଛତୁ ବଡ଼ି (Mushroom Nugget) -

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଛତୁ	୫୦୦ ଗ୍ରା	ବିରି	୫୦୦ ଗ୍ରା	କାଇବା ସୋଡା	୫ ଗ୍ରା
ଲୁଣ	ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ	କଞ୍ଚାଲଙ୍କା	୫ଟା		

ପ୍ରସ୍ତୁତି :

ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ । ବତୁରା ବିରିକୁ ଛତୁ, ଲୁଣ ଓ ଲଙ୍କା ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ । ସେଥିରେ ସୋଡା ପକାଇ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ରେରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବଡ଼ି ପକାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ । ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ଡବା କିମ୍ବା ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ୬ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଛତୁ ସୁପ୍ ପାଉଡର (Mushroom Powder) -

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଛତୁ ପାଉଡର	୧୦୦ ଗ୍ରା	କର୍ଣ୍ଣପ୍ଲୋର	୨୫ ଗ୍ରା	କ୍ଷାରଗୁଣ୍ଡ	୩୦ ଗ୍ରା
ରିଫାଇନ୍ ଡେଲ	୧୬ଗ୍ରା	ଲୁଣ	୫ ଗ୍ରା.	ଜିରା ପାଉଡର	୧୦ ଗ୍ରା
କଳାଜିରା	୫ ଗ୍ରା	ଚିନି	୨୦ଗ୍ରା	ଅଜିନୋମୋଟୋ	୫ଗ୍ରା
ଗୋଲମରିଚ	୧୦ଗ୍ରା.				

ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଶୁଖିଲା ଛତୁକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରି ଛତୁ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହା ସହିତ କ୍ଷାର ପାଉଡର, କର୍ଣ୍ଣପ୍ଲୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସୁପ୍ ପାଉଡର, ଏଥିରେ ସମପରିମାଣର ପାଣି ମିଶାଇ ସୁପ୍ ତିଆରି କରିବେ ।

ଛତୁ ବିସ୍କୁଟ୍ (Mushroom Biscuit) -

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ(%)	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ(%)	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ମଇଦା	୧୦୦ ଗ୍ରା	ଚିନି	୩୦ଗ୍ରା	ଘିଅ/ଡେଲ	୫୫ଗ୍ରା
ବେକିଂ ପାଉଡର	୦.୬ ଗ୍ରା	ସୋଡା	୦.୩ ଗ୍ରା	ଲୁଣ	୦.୬ ଗ୍ରା
ଭାନିଲାସେର	୦.୦୨ଗ୍ରା	କ୍ଷାର ପାଉଡର	୦.୫ ଗ୍ରା	ସୁକ୍ରୋଜ୍	୧.୫ ଗ୍ରା.

ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଚିନିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଘିଅ/ରିଫାଇନ୍ ଡେଲ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବେ । ତା'ପରେ ମଇଦାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶାଇବେ । ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମଇଦା, ଚିନି, ଖାଇବା ସୋଡା, ଲୁଣ, କ୍ଷାର ପାଉଡର ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଓ ପାଣି ସହିତ ୫ ମିନିଟ୍ ଗୋଳାଇବେ । ତା'ପରେ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଗୁନାଇ ରଖିବେ । ତା'ପରେ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ ୯୦ମିନିଟ୍ ରଖିସାରିଲା ପରେ ୨ରୁ ୪ ମିନିଟ୍ ବହଳରେ ଏକ ଟ୍ରେରେ ବିଛାଇବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ୨୧୦ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ ୧୦-୧୨ ମିନିଟ୍ ଓଭନ ଭିତରେ ବସାଇବା ପରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଛତୁ ସସ୍ / କେଚଅପ୍ (Mushroom Sauce / Ketchup) -

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଛତୁ	୧୦୦ ଗ୍ରା	ଲୁଣ	୧୦ଗ୍ରା	ଏଡିଟିକ୍ ଏସିଡ୍	୧.୫ଗ୍ରା
ଚିନି	୨୫୦ ଗ୍ରା	ସୋଡିୟମ ବେନଜୋଏଟ୍	୧ଗ୍ରା	ପିଆଜ	୧୦୦ ଗ୍ରା
ରସୁଣ	୫୦ ଗ୍ରା	ଅଦା	୫୦ ଗ୍ରା	ଜିରା	୧୦ ଗ୍ରା
କଳାଜିରା	୧ ଗ୍ରା.	ଲଙ୍କାପାଉଡର	୧୦ଗ୍ରା	ଅଜିନୋମୋଟୋ	୨୦ଗ୍ରା
ଆରାବୁଟ୍	୨୦ ଗ୍ରା				

ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ । ସେଥିରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇ ୨୦ମି. ସିଝାଇବେ । ମିଶ୍ରଣକୁ ଆସ୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ମିକ୍ସିରେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ । ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଷ୍ଟେନରେ ଘଷି ରସ ବାହାର କରିଦେବେ । ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ତୁଳିରେ ବସାଇ ସମସ୍ତ ମସଲା ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବେ ସସ୍ ପରି ବହଳିଆ ହୋଇ ଆସିଲେ ତୁଳାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ସୋଡିୟମ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ମିଶାଇବେ । ବିଶୋଧିତ କାଚ ବୋତଲରେ ଏହି ସସ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତିକରି ସିଲ୍ କରିଦେବେ ।

୧୦.୮ : ଛତୁ ଚଟଣୀ (Mushroom Chutney) -

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଛତୁ	୫୦୦ ଗ୍ରା	ଲୁଣ	ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ	ଟମାଟୋ	୨୫୦ ଗ୍ରା
ଚିନି	୩୦୦ ଗ୍ରା	ପିଆଜ	୧୦୦ ଗ୍ରା	ଅଦା	୫୦ ଗ୍ରା
ରସୁଣ	୫୦ ଗ୍ରା	ଜିରାଗୁଣ୍ଡ	୧୫ ଗ୍ରା.	ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼	୧୦ ଗ୍ରା
ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍	୧୦ ମି.ଲି.	ସୋରିଷ ତେଲ	୧୦୦ ମି.ଲି.	ସୋଡିୟମବେନଜୋଏଟ୍	୧ ଗ୍ରା.

ପ୍ରସ୍ତୁତି : କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ପିଆଜ, ଅଦା ଓ ରସୁଣକୁ ଚିକିଏ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ । ତା'ପରେ କଟା ଛତୁକୁ ପକାଇ ୫ମି. ଜାଳିବେ, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମସଲା, ଚିନି, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ ମିଶାଇ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଚଟଣୀ ବହଳିଆ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ୨ ମିନିଟ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବେ । ତାପରେ ସୋଡିୟମ ବେନଜୋଏଟ୍‌କୁ ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧିତ କାଟପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖିବେ ।

ଛତୁ ପାମ୍ପାଡ଼ :

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ବିରି ପାଉଁର	୫୦୦ ଗ୍ରା	ଖାଇବା ସୋଡ଼ା	୫ ଗ୍ରା.	ଛତୁ ପାଉଁର	୧୦୦ ଗ୍ରା
ଜିରାଗୁଣ୍ଡ	୧୦ ଗ୍ରା	ଗୋଲମରିଚ	୧୫ ଗ୍ରା	ଲୁଣ	ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ
ତେଲ	ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ				

ପ୍ରସ୍ତୁତି : ସମସ୍ତ ପାଉଁରକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହାକୁ ଚିକିଏ ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦେବେ । ତା'ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରି ବେଲଣା ପଟାରେ ବେଲି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛାଇ ଜାଗାରେ ଶୁଖାଇବେ । ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ପଲିଥିନ କିମ୍ବା ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖିବେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଛତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଛତୁରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରୋଇ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଛତୁ ଛତୁଆ :

ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ	ଉପାଦାନ	ପରିମାଣ
ଚାଉଳ ଭଜା ଗୁଣ୍ଡ	୨୫୦ ଗ୍ରା	ଛତୁ ପାଉଁର	୧୦୦ ଗ୍ରା	ବୁଟ ଭଜା ଗୁଣ୍ଡ	୨୫୦ ଗ୍ରା
ଅମୁଲ	୧୦୦ ଗ୍ରା	ଚୁଡ଼ାଗୁଣ୍ଡ	୨୫୦ ଗ୍ରା	ଚିନି	୨୫୦ ଗ୍ରା
ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ	୦୫ ଗ୍ରା	ଲୁଣ	ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ		

ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଅନମୋଦିତ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଭଜା, ବୁଟଭଜା ଓ ଚୁଡ଼ା ଭଜାକୁ ଏକତ୍ର ଗୁଣ୍ଡକରି ସେଥିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଛତୁଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅମୁଲ, ଚିନିଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଓ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ୬-୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ଛତୁଆକୁ ଶିଶୁ, ପ୍ରସୂତା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପୁଷିକର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଛତୁ ଚାଷରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିପରିବା ଭଳି ଛତୁରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଫିଙ୍ଗି ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଛତୁର ଉତ୍ପାଦନ କେତେକାଂଶରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଛତୁ ଚାଷର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅଭାବ, ଘର, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶୋଧନର ଅଭାବ ମଞ୍ଜିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁ ଛତୁରେ କବକ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି । କେତେକ କୀଟ ଛତୁର ବାସନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଛତୁରେ ଲାଗି ଛତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି । ସେସବୁର ପରିଚାଳନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣରୁ ଛତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯଥା- (୧) ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଫିଙ୍ଗି (Competitors), (୨) ରୋଗ, (୩) ଫିଙ୍ଗି ଜନିତ (Fungal), (୪) ଭୂତାଣୁ ଜନିତ (Virus), (୫) ବୀଜାଣୁ ଜନିତ (Bacteria), (୬) ବିକୃତତା (Abnormalities), (୭) କୀଟ ପତଙ୍ଗ (Insect pest) । ନିମ୍ନରେ ଏହା ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଫିଙ୍ଗି : ଏହି ଫିଙ୍ଗିମାନେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ଛତୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି । କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଫିଙ୍ଗିମାନେ ହେଲେ - ନୀଳ ଫିଙ୍ଗି (ଗ୍ରୀନ୍ ମୋଲ୍ଡ), ଫଲ୍‌ସ୍ ଛତୁ (ଫଲ୍‌ ଛତୁ), ଧୂସର ଫିଙ୍ଗି (ବ୍ରାଉନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମୋଲ୍ଡ), ହଳଦିଆ ଫିଙ୍ଗି (ଏଲୋ ମୋଲ୍ଡ), ଗୋବର ଛତୁ (ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାପ୍), ଲିପ୍‌ଷ୍ଟିକ୍ ମୋଲ୍ଡ, ଧୂଆଁଳିଆ ଫିଙ୍ଗି (ସ୍ମୋକ୍ ମୋଲ୍ଡ), ଗୋଲାପି ଫିଙ୍ଗି (ପିଙ୍କ୍ ମୋଲ୍ଡ), ଧଳା ଫିଙ୍ଗି (ହାଇଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମୋଲ୍ଡ), ନୀଳ ଫିଙ୍ଗି (ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମୋଲ୍ଡ) ।

ରୋଗ :

ଫିଙ୍ଗି ଜନିତ ରୋଗ : ଛତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଙ୍ଗି ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା- ଝେଟ୍ ବବଲ, ଡ୍ରାଏ ବବଲ, କବ୍ ଝେଟ୍, ନୀଳ ଫିଙ୍ଗି, ହଳଦିଆ ଫିଙ୍ଗି, ଧଳା ଫିଙ୍ଗି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାନ୍ତି ।

ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ : ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବହୁତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେରିଡା କିସମବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟଣ : ଛତୁର ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବ, ତଳ ଅଂଶଟି ଅଧିକ ଫୁଲିଯିବ, ଅପରିପକ୍ୱ ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଉନ୍ନତ ମାନର ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ୪% ପେଣ୍ଟାକ୍ଲୋରୋଫିନେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଟ୍ରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା ରଖିବେ ।

ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ :

ଛତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଙ୍ଗିଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯଥା- ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ଲୋଟ୍ (*Pseudomonas tolasii*), ଜିନଜର ବ୍ଲୋଟ୍ (*Pgingeri*), ମମି ଡିଜିଜ୍ (*Pseudomonas spp.*), ଡ୍ରିପ୍‌ଗିଲ୍ (*Pseudomonas agaricii*) ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାନ୍ତି ।

ମଞ୍ଜିରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ :

ଛତୁ ମଞ୍ଜିରେ ମଞ୍ଜି ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା (ଝଟ୍ ସବ୍) (*Bacillus subtilis*), ମଞ୍ଜି ଖଟାଳିଆ ହେବା ସାଝାର ସବ୍ (*Bacillus spp.*) ଯାହାଫଳରେ ମଞ୍ଜି ବେଡ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ ।

ଧୂଳିରି ଓ ପାଳଛତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଙ୍ଗି ଜନିତ ରୋଗ :

କ) ଗୋବର ଛତୁ (*Ink cap fundas-Coprinus spp.*) :

ଏହା ଏକ ଅଦରକାରୀ ଛତୁ । ଏହାର ନାଡ଼ ୫-୭ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ନାଡ଼ଟି ପୋଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂସର ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଅତି ପତଳା ଛତା ଥାଏ । ଏହା ପାଳଛତୁ ଓ ଧୂଳିରି ଛତୁ ଉପରେ ପୁଟିଥାଏ । ଏହି ଛତୁର ରେଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳ/ଧୂଳିରି ଛତୁ । ବେତରେ ନଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ି ଗାଡ଼ କଳା ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ । ଫଳରେ ବେତ ଉପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଛତୁ ପୁଟେ । କାରଣ - ଏହା ପୁରୁଣା ଓ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଅଧା ପଟା ନଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ବେତରେ ଅଧିକା ଗରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ଛତୁ ଦେଖାଯାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଥିବା ନଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଖରିପ୍ ଧାନର ନଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଛତୁ ବେତରେ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋବର ଛତୁ ଦେଖାଦେଲେ ହାତରେ କାଢ଼ି ବାହାରେ ପିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଖ) ସବୁଜ ଫିଙ୍ଗି (Green Mould - *Trichoderma harzianum*) :

ସମୟେ ସମୟେ ବେତ ପତ୍ତିବାର ୭-୮ ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେତଟି ସବୁଜ ଫିଙ୍ଗିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ଛତୁ ଫିଙ୍ଗି ବେତ ଉପରେ ମାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଫିଙ୍ଗି ପାଳଛତୁ, ଧୂଳିରି ଛତୁ ଓ ବୋତାମ ଛତୁରେ ଲାଗିଥାଏ ।

କାରଣ : ମେ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମାପ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଲେ ଏହି ଫିଙ୍ଗି ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ଭଲ ଭାବରେ ବାଷ୍ପାକରଣ ହୋଇ ନଥିବା ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ପାଳଛତୁ ଓ ଧୂଳିରି ଛତୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବା ବାଷ୍ପାକରଣ କରି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ବୋତାମ ଛତୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ନେହିଲେ ରସାୟନିକ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧନ (ନଡ଼ାରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା ୦.୩% ରସୁଣ ରସକୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସଂକ୍ରମିତ ବିହନ ଓ ଛତୁ ବେତକୁ ଛତୁ ଘରଠାରୁ ନିହାତି କମ୍ପରେ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଗ) ଅହଦିଆ ଫିଙ୍ଗି (Yellow mould - *Aspergillus niger*) :

ଛତୁ ବେତ ଓ ମଞ୍ଜି ବୋତଲରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫିଙ୍ଗି ମାଡ଼ିଯାଏ । ଏହାକୁ ଆସ୍ପରଜିଲସ୍ ନାମକର କୁହାଯାଏ । ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ଛତୁ ବେତ ଓ ମଞ୍ଜି ବୋତଲରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଛତୁଘର ଓ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବହୃତ ଗହମ ଓ ନଡ଼ାକୁ ଭଲଭାବେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଘ) ଧଳା ଫିଙ୍ଗି (White mould-Rhizopus / Sclerotium) :

ଲକ୍ଷଣ : ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅନେକ ଫିଙ୍ଗି ଛତୁ ବେତ ଓ ମଞ୍ଜି ବୋତଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏହା ସମୟେ ସମୟେ ଧଳା ତୁଳା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଧୂରେ ଧୂରେ ଧୂସର ଓ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଛତୁ ବେତ ଓ ମଞ୍ଜି ବୋତଲର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଛତୁ ବେତ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା ୦.୦୪ ଭାଗ କ୍ୟାପ୍ଟାନ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଡ) ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ :

ଲକ୍ଷଣ : ଧୂଳିରି ଛତୁର ନାଡ଼ ଓ ଦୁଇ କଡ଼ ହଳଦିଆ ଓ ପରେ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳିଯାଏ । ଏହା ପ୍ସେଡୋମୋନାସ୍ (*Pseudomonas* spp) ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଛତୁ ପୁଟିଗଲା ପରେ ପାଣି ପକାଯିବାରୁ ଏହି ଜୀବାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଛତୁ ପୁଟିଗଲା ପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଛତୁ ଉପରେ ପାରି ବୁନ୍ଦା ଜମି ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପରେ ବେତକୁ ସାମାନ୍ୟ ହଲାଇ ପାଣି ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଚ) କବ୍‌ସ୍ପେର୍ (Cob web) :

ଲକ୍ଷଣ : ନଡ଼ା ଓ ଛତୁରେ ତୁଳାଭଳି ପାଉଁଶ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଏ । ତାହା ଆସ୍ତ୍ରୋ ପତିଯାଏ ଏବଂ ଖରାପ ଗନ୍ଧ ମନ୍ଦ୍ୟ ବାହାରେ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ବାଉଁଶିନକୁ ୦.୦୦୪ ଶତକଡ଼ା ପାରିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରିବେ ।

ଛ) ବ୍ରାଉନ ରଟ (Brown rot) :

ଲକ୍ଷଣ : ନଡ଼ା ଓ ଛତୁ ଉପରେ ନରମ ଫିମ୍ପିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ମାଡିଥାଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଯାଗାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ପରେ ପତିଯାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ୧୦୦ ପିପି.ମ୍ ବାଉଁଶିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ । ସର୍ବଦା ବିଶୋଧିତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ / ନଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ପାରିବ ।

ବାଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ :

ପାଳଛତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯୋକ ଓ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

କ) କବ୍ ପଟା (Button Rot) :

Sclerotium spp ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫିମ୍ପିନାଶକ=କୀଟନାଶକ + ଜୀବାଣୁ ନାଶକର ସମନ୍ୱିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ (ମାଲାର୍ଥୁଆନ୍ ୦.୦୨୫% + ଡିଥେନ୍ ଜେଡ୍ ୭୮ + ଟ୍ରେପୋସାକ୍ଲିନ୍ ୦.୦୨୫%) । ପେନିସିଲିୟମ୍ ଆପ୍‌ସପରଜିଲସ୍, ରାଇଜୋପସ୍ ଏବଂ ସ୍ଟେରୋସିୟମ୍ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ଏହାର ନଡ଼ାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ରସାୟନିକ ବିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ।

ଖ) ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରଟ୍ (Pseudomonas alcaligigens) :

ଲକ୍ଷଣ : ଛୋଟ କଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଛତୁଟି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ, ପତିଯିବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛତୁର ବଢ଼ିବା କମାଇ ଦେବା ।

ଗ) ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ପଟ (Pseudomonas stutzeri) :

ଏହି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ କେବଳ ଧୂଳିରି ଛତୁର ନଡ଼ାରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ନଡ଼ାକୁ ୧୦୦ ପିପିଏମ୍ ଫର୍ମାଲିନ୍‌ରେ ବିଶୋଧନ କରି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।

ଛତୁ ବିକୃତତା (Mushroom abnormality / Disorder) :

ଛତୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟିକରି ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପରିବେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଏପଟସେପଟ ହେଲେ ବିକୃତତା ଦେଖାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟ ବିକୃତତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି - (୧) ଛତୁ ଅଧିକ ଟାଣ ହୋଇଯିବ : ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତାପ ହେଲେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । (୨) ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା : ଅଧିକ ଜଳିୟାଣ, ଉତାପ ଓ ଛତୁ ଘରକୁ କୌଣସି କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏପରି ହୁଏ । (୩) ନଡ଼ାଟି ଲମ୍ବା ମୋଡି ହୋଇଯିବା : ଛତୁଘରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ । (୪) ଛତୁ ଗେଟେମା ହୋଇଯାଏ : ମାଞ୍ଜିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଛତୁ ଫିମ୍ପି ମାଡିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଗେଟେମା ହୋଇଥାଏ । (୫) ଛତୁ ଫୁଲ କୋବି ପରି ହୋଇଯାଏ । ଛତୁ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କଳକାରଖାନାର ଗ୍ୟାସ୍ ଛତୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

କୀଟପତଙ୍ଗ :

ଛତୁ ମାଛି : ଛତୁ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ୩ ପ୍ରକାରର ମାଛି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ୨୭/୩୦° ସେଲ୍‌ସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୁଏ ଓ ୨-୪ ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନକାଳ ଶେଷ ହୁଏ ।

ସ୍କାରିଡ୍ ମାଛି (Scaarid Fly) : ଏହି ମାଛିର ଶରୀର ଲମ୍ବା । ଶରୀର କଳା ଓ ଧୂସର, ସରୁ ସରୁ ଗୋଡ଼, ଲମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣ୍ଠ ଥାଏ ।

ଲକ୍ଷଣ : ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଛି ଛତୁର ତଳ ପଟେ ଥିବା ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ । ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ମ୍ୟାଗଟ୍ ବାହାରି ଥାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଛି ଛତୁର କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ । ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗଟ୍ ଗିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଛତୁର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛତୁକୁ ଖାଇ ଟନେଲ (ନାଳୀ) କରନ୍ତି । ଫଳରେ ଛତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।

ଫୋରିଡ୍ ମାଛି (Florid Fly) : ଏହି ମାଛିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଫଳ ମାଛି ପରି । ଏମାନେ ସ୍କାରିଡ୍ ମାଛି ଠାରୁ ଛୋଟ ଓ ଶରୀର ମୋଟା । ମୁଣ୍ଡଟି ଛୋଟ, ଚଉଡ଼ା, ଲମ୍ବ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଲାଞ୍ଜ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଜିଆ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଏ ।

ସେସିଡ୍ ଫ୍ଲାଇ (Cecid Fly) : ଏହି ମାଛି ଛତୁର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରହି ଛତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରାୟତଃ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଛତୁ ଏହି ସେସିଡ୍ ଫ୍ଲାଇ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଗେଡ଼ା ଓ ତେଲୁଗୁଣି ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ ଛତୁଘର ମଧ୍ୟରେ ଧୋଖାଯାଆନ୍ତି । ଏମାନେ ଛତୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଚାଲି ଖସିବା ଜେଲି ପରି ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି । କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛତୁକୁ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି ।

ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା :

- ♦ ଛତୁ ଘରେ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଛତୁ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ବ୍ଲିଟିଂ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ ଏହା ମାଛିମାନଙ୍କୁ ବିକର୍ଷିତ କରିବ ।
- ♦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଛତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ତୋଳି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ♦ ଛତୁ ବେଡକୁ ତଳେ ନ ପକାଇ ୬ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚରେ ଭାଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପକାନ୍ତୁ ।
- ♦ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ୍‌ରନିମ୍‌ଜାତ କୀଟନାଶକ ୧ଲି. ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି. ମାଲାଥ୍‌ଆନ୍ ମିଶାଇ ବାହାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଛତୁ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ♦ ବେଡ୍ ଉପରୁ ପଲିଥିନ୍ କାଢ଼ି ଦେଲା ପରେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ମାଲାଥ୍‌ଆନ୍ ମିଶାଇ ବାହାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଛତୁ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ♦ ଛତୁ ଘରର ଝରକା, ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଓ କବାଟ ଦ୍ୱାରରେ ଜାଲି ଲଗାଇ ବାହାରୁ ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକନ୍ତୁ ।
- ♦ ଛତୁ ଘରେ ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ଧୁଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ♦ ଛତୁ ଘରେ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ଓ ନୀଳ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ ।
- ♦ ଛତୁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ (୫ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୫୦୦ ମି.ମି.) ଫର୍ମାଲିନ୍ ପକାଇ ସିଞ୍ଚନ କରି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ♦ ଟ୍ରାଟନାଶକ ବେଗନ୍ + ପାଣିକୁ ୧:୧୦ ଅନୁପାତରେ ନେଇ ସେଥିରେ ଚିନିଶିରା ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୀଟ ଦମନ ହୁଏ ।

ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ

୧. ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ପ୍ରକାର ଛତୁ ଭିତରୁ ୨ ହଜାର ପ୍ରକାର ଛତୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ପ୍ରକାର ଛତୁ ବିଷାକ୍ତ । ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ଛତୁ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ଭୋଗ କ୍ଷାମ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବାସନା ନେଇ । ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଛତୁ ଖାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ମଧ୍ୟ କାଇଥିବ । ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛତୁକୁ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଜାରିବାର ଉପାୟ ବାହାରିଥିବ ।
୨. ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିକାଣ୍ଡେରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ରୂପା ଚାମଚ କଳା ପଡିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁକୁ ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ରୂପା ଚାମଚ କଳା ପଡେନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମିନିତା ଫେଲଜଡସ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଦ୍ୱାରା ରୂପା ଚାମଚ କଳା ପଡେନାହିଁ ।
୩. ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ରଙ୍ଗୀନ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗର ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷାକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଧଳା କିମ୍ବା ଲହୁଣୀ ରଙ୍ଗର ଛତୁ ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାନ୍ଦେରେଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାଲକ୍ଲୋମାନୁଡାନର ରଙ୍ଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲେ ହେଁ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମିନିତା ଫେଲଜଡସ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଗୋପି, ଆମିନିତା ଭେର୍ଣ୍ଣା ବା ନିର୍ବୋଧର ଛତୁ, ଆମିନିତା ଭେରୋସା ବା ଧୂସର ଦୂତ ଆଦି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଲେ ହେଁ ଭୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ।
୪. ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସାପଗାତ, ଲୁହାକଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡିଆ ଯୋତା, ଅଳିଆଗଦା, ଗୋବର, ବିଷାକ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।
୫. ଆଜିକାଲି ଗବେଷଣାଗାରରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ଏହା ବିଷାକ୍ତ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଛତୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଠେକୁଆ ଖାଇ ହଜମ କରିଦେବ ଏବଂ ତା'ଦେହରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେବନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ବିଷାକ୍ତ ହେବ ।
୬. କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଛତୁ ଆକାର, ଗଠନ, ରଙ୍ଗ ଆଦି ଏକା ପ୍ରକାର । କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଛତୁ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଭେଦରୁ ଗୋଟିଏ ଛତୁରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିହେବ । ଉଦାହରଣତଃ ଲେପିଓଟା ମାରଗାନି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲେପିଓଟା ରାକୋଡେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ।
୭. ଗାୟରୋମିଡ୍ରା ଏସ୍କୁଲେଷ୍ଟା ନାମକ ଛତୁ ଯୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲା । ପରେ ଦେଖାଗଲା ଏହାକୁଖାଇ ବହୁଲୋକ ମରିବା ଯୋଗୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରାଗଲା ।
୮. ଗୋବର ଛତୁଭଳି କେତେକ ଛତୁ କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।
୯. ଭିନେଗାର ପାଣିରେ ବହୁଦିନ ଛତୁ ରଖିଲେ ତା'ର ବିଷକ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟନୁହେଁ, ଏହି ପାଣି ଓ ଭିନେଗାରରେ ବହୁଦିନ ଛତୁ ରଖିଲେ ପିତା ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଷ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ।
୧୦. କେତେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ବଦହଜମର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଯୋଗୁ କେତେକ ଛତୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ । ପରନ୍ତୁ ସେହି ଛତୁ ଖାଇ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି । ଅଧିକ ଖାଇଲେ, କିମ୍ବା ହଜମ ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଛତୁ ଖାଇଲେ ଅଥବା ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଛତୁ ଖାଇଲେ ବଦହଜମ ବା ଆଲର୍ଜି ହୋଇଥାଏ ।
୧୧. ମଦସହ ଛତୁ ଖାଇଲେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଦ ସହ ଗୋବର ଛତୁ ଖାଇଲେ ଚର୍ମରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଟାକ୍ସନୋମିଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ୍ । ଅଥବା ବିଷାକ୍ତ ଛତୁର ଆକାର, ପ୍ରକାର, ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ବିଷାକ୍ତ ଛତୁର କୁପ୍ରଭାବ :

ବିଷାକ୍ତ ଛତୁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ କରାଯାଇଛି । ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇବା ପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣକୁ ୬ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ, ଯଥା- ୧) ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବିଷାକ୍ତ

କାରକ, ୨) ହଜଳାକାରକ, ୩) ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବିଷାକ୍ତକାରକ, ୪) ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ କାରକ, ୫) ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଷାକ୍ତ କାରକ, ୬) ମାଂସପେଶୀ ବିଷାକ୍ତକାରକ ।
ଚିକିତ୍ସା :

ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ରୋଗୀକୁ ବାନ୍ତିକରାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । ଯଦି ବାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ତେବେ ଅଧିଗ୍ନାସ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସୋରିଷଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳାଇ ପିଅନ୍ତୁ । ଆପୋମୋଜିଫାଲିନ୍ ଟାରଟାର ଇମେଟିକ୍ କିମ୍ବା ଜିକ୍ ଓଲ୍‌ପେଟକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଆଇ ଦେବେ । ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟିଯାକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଛତୁ ଫାର୍ମ ଆବର୍ଜନାରୁ ଜିଆଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଜିଆଖତ ବା ଭର୍ମ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ୧-୧.୫%, ଫସଫରସ୍ ୧.୬-୮% ଏବଂ ପଟାସ୍ ୧.୨-୧.୫% ରହିଥାଏ ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପାଳ ଛତୁ, ଧୂଳିରି ଛତୁ ବା ଦୁଧ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫାର୍ମରୁ ଛତୁଚାଷ ପରେ ମିଳୁଥିବା ନଡ଼ାକୁ ଏଣେତେଣେ ନଦେଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ୧୫ରୁ ୨୫ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ ୫ଫୁଟ ଚଟାଣରେ ଏକ ଖାତ ଖୋଳନ୍ତୁ । ଏହା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ବିଛାଇ ସେଥିରେ ଛତୁଫାର୍ମରୁ ମିଳିଥିବା ନଡ଼ାକୁ ୯ ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାନ୍ତୁ । ତା' ଉପରେ ୩ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ୫୦% ଓଦା ଅଖା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଖାତରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ସେଥିରେ ୧ କିଗ୍ରା ଜିଆ (ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ଟି) ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯେପରି ୫୦% ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ । ଏକମାସ ପରେ ଏହା ଜିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

୧ମି. ଲମ୍ବ, ୧ମି ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ୩୦ସେମି ଗଭୀର ଏକ କୁଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ୫ ସେମି ବହଳରେ ନଡ଼ିଆ କଟା, କୁଣ୍ଡା ବା ଆଖୁଛେଦା ବିଛାଇ ତା'ଉପରେ ୧ ସେମି ବହଳର ୬-୮ଦିନର ପୁରୁଣା ଗୋବର ବିଛାନ୍ତୁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ୫ସେମି ବହଳର କରତ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା, ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନଡ଼ା ବିଛେଇ ଏହା ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସ୍ତର ଦୁଇଟିକୁ ଓଦା ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଉପରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ସେମି ବହଳର ଘରୁ ବା ଚିଲରୁ ମିଳୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ବିଛାନ୍ତୁ । ତା'ଉପରେ ୫ସେମି ବହଳର ଶୁଖିଲା ଗୋବର ବା ଖତ ବିଛାନ୍ତୁ । ତା ଦେହରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ୪୦-୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରେ ।

କ୍ର.ନଂ.	ଉପାଦାନ	ଅନୁପାତ
୧.	୭ଦିନର ପୁରୁଣା ଗୋବର ଏବଂ ସଜ ଗୋମୂତ୍ର	
୨.	ସବୁଜ ପତ୍ର ଏବଂ ଚୂନି	୫:୩
୩.	ଗହମ ଏବଂ ଗୋବର ଘସି	୧୦:୩
୪.	କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋବର	୧୦:୩
୫.	ଗୋବର ଏବଂ ଛେଳି ବା ମେଷା ମଳ	୧୦:୧
୬.	କଟାନଡ଼ା ଏବଂ କଞ୍ଚା ଗୋବର	୧୦:୩

ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ଜମା କରିବା ପରେ ଗଦା ଉପରେ ଏକ ଝୋଟ ଅଖାକୁ ୫୦% ଓଦାକରି ସେଥିରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ । ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗଦା ତିନି ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କଳା ବା ଧୂସର ହୋଇଯିବ । ସେଥିରେ ୧ କିଗ୍ରା ଜିଆ (ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦୦ଟି) ଅଖା ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜିଆ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଅଖା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଯେପରି ୫୦% ଓଦା ରହେ । ଉପର ସ୍ତରରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩-୪ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ । କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ମୂଷା, ଜମ୍ବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ବେଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଆକୁ ଖାଇ ନଦିଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ୪% ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ । ୧୦୦୦ଟି ଜିଆକୁ ନେଇ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ୪ ସପ୍ତାହ ପରେ ଦୈନିକ ୫ କିଗ୍ରା ଖତ ମିଳିପାରିବ ।